

Module 1.3.1.3 – BE – FR	<b>NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR</b>
MELISANA N.V., 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Bruxelles	<b>Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer</b>
ID261078	Page 1 de 5

## Notice: information de l'utilisateur

### **Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer**

Hydroxyde de magnésium / Hydroxyde d'aluminium

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 14 jours.

#### **Que contient cette notice**

1. Qu'est-ce que Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer?
3. Comment utiliser Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer et dans quel cas est-il utilisé?**

L'indication doit être limitée au traitement symptomatique de courte durée (14 jours) des brûlures d'estomac (pyrosis) et des douleurs gastriques.

#### **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer?**

##### **N'utilisez jamais Maglid**

- Si vous êtes allergique à l'hydroxyde de magnésium, à l'hydroxyde d'aluminium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous souffrez d'une détérioration rénale grave.
- Chez les enfants sans suivi médical.

##### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Maglid.

- Il est déconseillé de prendre ce médicament pendant une période prolongée (14 jours) sans en parler à votre médecin, en particulier si vous êtes enceinte.
- Maglid contient du saccharose (sucre). Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Module 1.3.1.3 – BE – FR	<b>NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR</b>
MELISANA N.V., 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Bruxelles	<b>Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer</b>
ID261078	Page 2 de 5

- Si vous prenez encore d'autres médicaments. Veuillez lire la section "Autres médicaments et Maglid".

### **Enfants**

Ne pas administrer aux enfants sans surveillance médicale.

Chez les jeunes enfants, l'utilisation d'hydroxyde de magnésium peut provoquer une hypermagnésémie, en particulier s'ils présentent une insuffisance rénale ou une déshydratation.

### **Autres médicaments et Maglid**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

- Les hydroxydes d'aluminium et de magnésium peuvent perturber l'effet de certains médicaments s'ils sont administrés en même temps; notamment les anticholinergiques, la kétoconazole, l'itraconazole, les barbituriques, la digoxine, la quinine, la quinidine, la warfarine, les tétracyclines, les quinolones, les vitamines, les phosphates, les anticoagulants coumariniques, les salicylés, les amphétamines et certains sulfamides. Il est important de respecter un intervalle d'au moins 2 heures entre l'administration de Maglid et ces médicaments.
- Respecter un intervalle d'au moins 4 heures entre la prise de Maglid et des médicaments contenant des quinolones.
- La prise concomitante d'alcool, de café ou de boissons contenant de l'acide citrique, telles que les jus de fruits, doit être évitée.
- Si vous suivez un traitement contre les ulcères à l'estomac (antagoniste des récepteurs H<sub>2</sub>), n'utilisez ce médicament qu'avec l'accord de votre médecin.
- Certains médicaments peuvent être influencés par l'hydroxyde de magnésium ou influencer sur l'efficacité de l'hydroxyde de magnésium. Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez déjà des salicylates.
- L'utilisation simultanée de Maglid et de dolutégravir ou d'elvitégravir doit être évitée. Prendre Maglid au moins 6 heures avant ou au moins 2 heures après le dolutégravir. Prendre Maglid au moins 4 heures avant ou au moins 4 heures après l'elvitégravir. (veuillez consulter la notice des produits concernés).
- L'utilisation de raltégravir avec Maglid est déconseillée (consulter la notice du produit concerné).

### **Maglid avec des aliments, boissons et de l'alcool**

La prise concomitante d'alcool, de café ou de boissons contenant de l'acide citrique, telles que les jus de fruits, doit être évitée.

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

#### Grossesse

- De fortes doses de Maglid ne peuvent pas être prises pendant la grossesse.
- En outre, pendant la grossesse, Maglid ne peut pas être pris pour une durée de plus de deux semaines.
- Tout renouvellement de la prise de Maglid pour une durée de plus de deux semaines ne peut se faire sans l'accord du médecin pendant la grossesse.

#### Allaitement

- Les composés d'aluminium passent dans le lait maternel.
- De fortes doses de Maglid ne peuvent pas être prises pendant l'allaitement.

Module 1.3.1.3 – BE – FR	<b>NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR</b>
MELISANA N.V., 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Bruxelles	<b>Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer</b>
ID261078	Page 3 de 5

- En outre, pendant l'allaitement, Maglid ne peut pas être pris pour une durée de plus de deux semaines.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

**Maglid contient du saccharose (sucre).** Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **3. Comment utiliser Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de:

Administer 1 à 2 heures après le repas et au coucher.

Les comprimés à croquer se prennent sans eau, ils se sucent ou se croquent.

Prenez 1 ou 2 comprimés à chaque prise. En général, on prendra entre 4 et 8 comprimés répartis au cours de la journée.

En cas d'ulcère, la posologie pourrait être précisée par votre médecin.

Il y a lieu de consulter votre médecin si les troubles digestifs perdurent pendant plus de **14 jours**.

#### **Si vous avez utilisé plus de Maglid que vous n'auriez dû.**

Si vous avez utilisé trop de Maglid, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (**070/245.245**).

Lors de l'ingestion exagérée de comprimés de Maglid (le contenu de plusieurs boîtes) on pourrait constater des troubles de l'estomac et de l'intestin.

Les personnes souffrant d'un mauvais fonctionnement rénal pourraient également constater une diminution de la tension ou un ralentissement de la respiration, et exceptionnellement, une perte de conscience.

Si les symptômes sont graves, il est recommandé de consulter un médecin qui décidera de la conduite à tenir.

#### **Si vous oubliez d'utiliser Maglid**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### **Si vous arrêtez d'utiliser Maglid**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. Quels sont les effets indésirables éventuels?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Module 1.3.1.3 – BE – FR	<b>NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR</b>
MELISANA N.V., 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Bruxelles	<b>Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer</b>
ID261078	Page 4 de 5

- Nausée, vomissement, constipation et diarrhée peuvent se produire. Si ces symptômes sont graves, il faut évidemment arrêter le traitement et consulter votre médecin.
- Douleurs abdominales (fréquence indéterminée).
- Hypermagnésémie. Cela a été observé après une administration prolongée à des patients atteints d'une insuffisance rénale (fréquence : très rare).
- Chez les personnes souffrant de troubles du fonctionnement rénal, l'hydroxyde de magnésium peut entraîner une dépression du système nerveux central.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

#### **Belgique**

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé  
Division Vigilance  
EUROSTATION II  
Place Victor Horta, 40/ 40  
B-1060 Bruxelles  
Site internet: [www.afmps.be](http://www.afmps.be)  
e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

#### **Luxembourg**

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments  
Villa Louvigny – Allée Marconi  
L-2120 Luxembourg  
Site internet: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **5. Comment conserver Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

#### **Ce que contient Maglid**

- Les substances actives sont: hydroxyde de magnésium 200 mg - hydroxyde d'aluminium 200 mg.

Module 1.3.1.3 – BE – FR	<b>NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR</b>
MELISANA N.V., 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Bruxelles	<b>Maglid 200 mg/200 mg comprimés à croquer</b>
ID261078	Page 5 de 5

- Les autres composants sont: macrogol 4000 - stéarate de magnésium - talc - huile essentielle de menthe - saccharose (voir rubrique 2 «Maglid contient du saccharose (sucre)»).

### **Aspect de Maglid et contenu de l'emballage extérieur**

Maglid est un médicament se présentant sous la forme de comprimés à croquer, emballés en boîtes de 8 ou 48 comprimés sous blister.

### **Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

#### Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Melisana SA  
Avenue du Four à Briques 1  
B-1140 Bruxelles

#### Fabricant

Sanico SA  
Industriezone 4 Veedijk 59  
B-2300 Turnhout

### **Numéro d'Autorisation de mise sur le marché**

BE156003

### **Mode de délivrance**

Médicament non soumis à prescription médicale.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 02/2019**