

## BIJSLUITER

### **Benaming**

MEFREN 5 mg zuigtabletten  
Chloorhexidine dichloorhydraat

### **Samenstelling**

Chlorhexidinum dichlorhydr. 5 mg - Sorbitolum - Cellulos. microcrist. - Polyethyl. glycol. 6000 - Amyl. maydis - Natrii saccharin. - Natrii chloridum - Gum. xanth. - Ac. citric. monohydr. - Aeth. supercitri-A - Magnesii stearas.

### **Farmaceutische vorm en presentatie**

Zuigtabletten.  
Doos met 24 zuigtabletten.

### **Farmacotherapeutische groep**

Zuigtabletten met ontsmettende eigenschappen.

### **Vergunningshouder**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.  
Site Apollo  
Avenue Pascal, 2-4-6  
B-1300 Wavre

### **Fabrikant**

Famar Italia S.p.A.  
I - 20021 Baranzate di Bollate (MI) (Italië)

### **Aangewezen bij**

- Behandeling van de symptomen van infecties van mond en keel.

- Voorkomen van verwickelingen door infecties na het trekken van tanden of na heelkundige ingrepen in mond en keel.

### **Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden**

Wanneer u overgevoelig bent voor chloorhexidine of voor één van de andere bestanddelen van het product.

Mefren zuigtabletten niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar en bij baby's.

### **Bijzondere voorzorgen**

De behandeling niet langer dan 5 dagen voortzetten (risico op verstoren van het evenwicht van de mondflora). Raadpleeg uw arts indien de symptomen niet verdwenen zijn na 5 dagen.

### **Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding**

Risico op antagonisme of inactivatie wanneer andere antiseptica toegediend worden.

### **Gebruik in geval van zwangerschap en borstvoeding**

Voortplantingsstudies bij dieren, met herhaalde toediening van zeer hoge doses, hebben geen risico voor de vrucht tijdens de zwangerschap aangetoond.

Of chloorhexidine in de moedermelk wordt uitgescheiden is niet gekend. Dierproeven hebben geen enkel nadelig effect op de nakomelingen aangetoond.

Zoals bij de meeste geneesmiddelen is het bij wijze van voorzorg beter geen Mefren zuigtabletten te gebruiken tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap en gedurende de borstvoeding, behalve op advies van de arts.

### **Hoe gebruiken en hoeveel ?**

- Kinderen vanaf 6 jaar : 4 zuigtabletten per dag
- Volwassenen : 6 tot 8 zuigtabletten per dag

De tabletten langzaam laten smelten tussen wang en tandvlees.

### **Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden**

Chloorhexidine wordt slechts in geringe mate door het spijsverteringsstelsel opgenomen.

Daarom is het weinig waarschijnlijk dat toevallige inname aanleiding zou geven tot algemene effecten, tenzij het zou gaan om grote hoeveelheden.

In dit laatste geval moet uw arts geraadpleegd worden. Hij zal alle nodige maatregelen treffen.

Wanneer u te veel van Mefren zuigtabletten heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

**Ongewenste effecten**

Soms : prikkeling van de slijmvliezen.

Zelden : allergische reactie onder vorm van huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden of lage bloeddruk.

Dit geneesmiddel kan een verkleuring van de tanden of de tong veroorzaken, bij langdurig en continu gebruik. Deze verkleuring kan echter verwijderd worden.

Raadpleeg uw arts of uw apotheker bij het optreden van een ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter is beschreven.

**Bewaring**

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), beschermen tegen licht en vocht.

Dit product heeft een beperkte houdbaarheid. De vervaldatum is op de verpakking aangegeven na de letters EXP gevolgd door 6 cijfers : de twee eerste cijfers geven de maand aan (eerste dag van deze maand) en de vier laatste cijfers het jaar.

Dit geneesmiddel niet gebruiken na deze datum.

**Afleveringswijze:**

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:**

BE158751

**Laatste bijwerking van de bijsluiter**

Mei 2010.

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 03/2016**