

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

### Buscopan 10 mg omhulde tabletten butylhyoscine bromide

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is BUSCOPAN en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. WAT IS BUSCOPAN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?**

Buscopan bevat als werkzame stof butylhyoscine bromide, een spasmolyticum.

Het is aangewezen voor de behandeling van **krampen van het spijsverteringskanaal, de galwegen, de urinewegen en de geslachtsorganen**. Bijvoorbeeld bij galblaas- of nierkolieken, spastisch colon (ook prikkelbare darm genoemd), krampen van de slokdarm en de maag, krampen bij diarree of maagdarmondsteking.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- u bent allergisch voor butylhyoscine bromide of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- tijdens de zwangerschap en de borstvoeding
- als u lijdt aan:
  - prostaatadenoom (goedaardige prostaattumor), hypertrofie (toename van volume) van de prostaat met urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
  - niet behandeld geslotenhoekglaucoom (verhoogde druk in het oog)
  - maagvernauwing, darmatonie (afgenomen darmspanning), mechanische maagdarmondsteking, megacolon (blijvende verwijding van het colon)
  - te hoog hartritme
  - ernstige myasthenie (abnormale vermoeidheid van de spieren)

- een zeldzame erfelijke aandoening van intolerantie voor bepaalde suikers (zie rubriek 2, «*Buscopan bevat*»).
- bij kinderen jonger dan 1 jaar.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

- Het is absoluut noodzakelijk om de behandelingsduur te beperken en af te stemmen op de symptomen. Raadpleeg uw arts:
  - als de pijn niet voorbij gaat of verergert
  - in geval van koorts, misselijkheid, braken, problemen met de stoelgang, zich onwel voelen of bloed in de stoelgang gepaard gaande met pijn
  - bij urinestoornissen: frequent urineren, moeilijk urineren, pijn bij het urineren, lendenpijn.
- Voorzichtigheid is geboden bij:
  - patiënten die gemakkelijk intestinale of urinaire obstructies ontwikkelen
  - patiënten met een onregelmatig hartritme
  - oudere personen.
- Toediening van Buscopan is niet aanbevolen bij gastro-oesofagale reflux.
- Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "*Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?*" te lezen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

### **Kinderen**

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Buscopan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vraag uw arts altijd om advies voordat u verschillende geneesmiddelen gaat combineren:

- Buscopan kan, als het samen met bepaalde geneesmiddelen wordt gebruikt, hun werking of zijn eigen effect versterken: geneesmiddelen tegen depressie, antipsychotica (geneesmiddelen tegen bepaalde psychiatrische aandoeningen), geneesmiddelen tegen allergie, andere anticholinergica zoals tiotropium of ipratropium (geneesmiddelen tegen ademhalingsproblemen), kinidine en disopyramide (behandeling van hartritmestoornissen) en amantadine (middel tegen Parkinson).
- De effecten van bepaalde geneesmiddelen die het hartritme verhogen (bètamimetica), kunnen door Buscopan worden versterkt.
- Omgekeerd kan Buscopan het effect remmen van geneesmiddelen die de maagmotiliteit stimuleren (metoclopramide, cisapride, alizapride, domperidon).

### **Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?**

Niet van toepassing.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Buscopan geeft soms aanleiding tot gezichtsstoornissen en duizeligheid. Daarom is voorzichtigheid geboden en moet de patiënt eventuele gevaarlijke taken zoals rijden of machines bedienen vermijden wanneer hij één van deze bijwerkingen gewaarwordt.

**Buscopan bevat saccharose** (een suiker). Gebruik dit geneesmiddel niet als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt. Neem contact op met uw arts voor meer informatie.

### 3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Volwassenen: 1 à 2 tabletten, 3 tot 5 maal per dag, maar 100 mg per dag niet overschrijden (= 10 tabletten).

#### **Gebruik bij kinderen**

- Kinderen vanaf 6 jaar: zie volwassenen.
- Kinderen jonger dan 6 jaar: zoals de arts voorschrijft, maar 1,5 mg/kg/24 uur niet overschrijden.
- Buscopan is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 1 jaar.

De tabletten inslikken met een beetje water, zonder stuk te bijten.

Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 7 dagen zonder een arts te raadplegen.

#### **Langdurig gebruik van Buscopan:**

De behandelingsduur mag niet langer duren dan de periode van de symptomen om te vermijden dat medicamenteuze darmatonie (verminderde tonus) optreedt. Buscopan mag niet dagelijks gedurende lange tijd worden gebruikt zonder de oorzaak van de buikkrampen op te sporen.

#### **Heeft u te veel van dit middel ingenomen?**

Wanneer u te veel van BUSCOPAN heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

De symptomen van overdosering zijn beschreven in rubriek 4 “*Mogelijke bijwerkingen*”.

#### **Bent u vergeten dit middel in te nemen?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

#### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Raadpleeg steeds uw arts indien u van plan bent om de behandeling stop te zetten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

#### **Immuunsysteemaandoeningen**

- allergische reacties, meer bepaald ter hoogte van de huid (urticaria, jeuk, huidrupties, roodheid)
- ademhalingsproblemen
- zeldzame gevallen van shock

#### **Bloedvataandoeningen**

- bloeddrukval, duizeligheid, roodheid van het gezicht

#### **Oogaandoeningen**

- tijdelijke gezichtsstoornissen, verwijding van de pupil, verhoging van de druk binnen in het oog

Als u na de toediening van Buscopan oogpijn krijgt in combinatie met rode vlekken en gezichtsverlies, **raadpleeg dan een oogarts.**

#### **Hartaandoeningen**

- verhoging van het hartritme

#### **Maagdarmsstelselaandoeningen**

- droge mond
- remming van de gastro-intestinale motiliteit

#### **Huid- en onderhuidaandoeningen**

- verminderde transpiratie

#### **Nier- en urinewegaandoeningen**

- urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks meldenvia het nationale meldsysteem:

#### *België*

Website: [www.afmps.be](http://www.afmps.be)

E-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

#### *Luxemburg*

Website: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

Bewaren beneden 25°C, in zijn oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof in dit middel is: Butylhyoscine bromide 10 mg
- De andere stoffen in dit middel zijn: Calciumhydrogeenfosfaat watervrij – Maïszetmeel – Oplosbaar zetmeel – Colloïdaal sillicium watervrij - Wijnsteenzuur - Stearinezuur - Povidon - Saccharose (zie rubriek 2 "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken") - Talk – Arabische gom - Titaandioxide - Macrogol – Carnauba was – Witte bijenwas

### **Hoe ziet Buscopan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Omhulde tabletten à 10 mg. Dozen met 50 en 20 omhulde tabletten in alu/PVC blisterverpakking. Kliniekverpakking met monodosissen, kliniekverpakking met 500 omhulde tabletten, in alu/PVC blisterverpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Is ook verkrijgbaar in oplossing voor injectie (à 20 mg/1 ml) en zetpillen (à 10 mg).

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Arianelaan 16, 1200 Brussel

**Fabrikant**

Delpharm Reims, 10 Rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Frankrijk

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** BE021183

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift

**Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2016**

**Datum goedkeuring: 02/2016.**