

NOTICE

Dénomination

AUGVERZ 1 mg/ml + 3 mg/ml collyre en solution

Composition

Dextran 70 1,0 mg - Hypromellos. 3,0 mg - Polidronii chlor. 0,011 mg - Borax - Natr. chlor. - Kal. chlor. - Natr. hydrox. et/aut Ac. hydrochlor. - Aq. purif. q.s. ad 1 ml.

Forme pharmaceutique

Collyre en solution.
Flacon stilligoutte de 5, 10 et 15 ml.

Groupe pharmacothérapeutique

Gouttes oculaires contre les yeux secs.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Alcon NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde

Fabricant

SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
2870 PUURS

Alcon Cusi S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Espagne

Indiqué dans

- Les yeux secs
- Une insuffisance lacrymale
- Une instabilité du film lacrymal

Cas où l'usage du médicament est déconseillé

Hypersensibilité à l'un des composants de cette préparation.

Précautions particulières

En cas d'irration persistante, interrompre les instillations.

AUGVERZ est un produit stérile. Afin d'éviter toute contamination, ne pas toucher l'embout du flacon.

Pour usage local oculaire exclusivement.

Grossesse et allaitement

L'hypromellose et le Dextran 70 sont des substances inertes sans activité pharmacologique. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une résorption systémique ou une toxicité systémique ou un effet quelconque sur la capacité de reproduction.

Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Étant donné que les gouttes oculaires peuvent provoquer une vue trouble passagère après l'instillation, il est déconseillé de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines dangereuses sauf si la vue est claire.

Comment l'utiliser et en quelle quantité

Une ou deux gouttes dans chaque oeil, chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

Effets indésirables

Exceptionnellement, le produit peut causer une irritation locale. Des réactions d'hypersensibilité locale se produisent rarement.

Si vous ressentez un effet indésirable grave ou un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Conservation

Vérifier la date de péremption sur l'emballage.

Bien refermer après chaque usage.

A conserver hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Jeter ce médicament quatre semaines après la première ouverture du flacon.

Stabilité

Non-ouvert: voir la date de péremption sur l'emballage après le signe "Exp" (mois/année).

Date de la dernière mise à jour de la notice

02/2018

Date de l'approbation de la notice

03/2018