

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**DAKTOZIN 2,5 mg/150 mg zalf**

Miconazolnitraat en zinkoxide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Daktozin en waarvoor wordt Daktozin gebruikt?
2. Wanneer mag u Daktozin niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Daktozin?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Daktozin?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS DAKTOZIN EN WAARVOOR WORDT DAKTOZIN GEBRUIKT?

Daktozin is een uitwendig middel tegen luijdermatitis. Het bevat een antimycoticum (miconazolnitraat) en een lokaal beschermend geneesmiddel (zinkoxide). De zalf kleeft goed en langdurig aan de huid en beschermt ze tegen de irriterende invloed van de urine en stoelgang. Op die manier worden schimmels en bacteriën snel vernietigd en treedt een spoedig herstel van de huid op. Daktozin is aangewezen bij de behandeling van de droge en vochtige vorm van huidontsteking bij baby's en peuters die het gevolg is van een te lang contact van de urine en stoelgang in de luier met de huid (luijdermatitis). Niet zelden treedt op die plaats een bijkomende besmetting met schimmels op.

2. WANNEER MAG U DAKTOZIN NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**Wanneer mag u Daktozin niet gebruiken?**

- Uw baby of peuter is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel of voor andere azool-derivaten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Daktozin?

- U mag Daktozin niet aanbrengen op open wonden.
- U moet ieder contact met de ogen vermijden.
- Wanneer een overgevoeligheidsreactie of irritatie optreedt, moet u de behandeling beëindigen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt de patiënt naast Daktozin nog andere geneesmiddelen, of heeft de patiënt dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat de patiënt in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan de arts of apotheker.

Een zeer kleine hoeveelheid van dit geneesmiddel kan worden geabsorbeerd in het bloed na plaatselijke toepassing. Het werkzaam bestanddeel van Daktozin, miconazol, kan bepaalde enzymen van het metabolisme inhiberen. Zo kan er een invloed zijn van miconazol op andere geneesmiddelen. Bij patiënten die een bloedverdunnend middel gebruiken, zoals warfarine, moet men voorzichtig zijn. De stolling moet dan regelmatig worden gecontroleerd.

De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Dit is het geval voor middelen die gebruikt worden bij suikerziekte en voor fenytoïne (middel dat gebruikt wordt bij epilepsie). Daarom dient u voorzichtig te zijn als er naast Daktozin één van deze middelen wordt gebruikt.

Bij beperkte opname in de bloedbaan treden klinisch relevante interacties zeer zelden op.

Daktozin mag niet gemengd worden met andere zalven of geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoedingZwangerschap

Daktozin wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen.

Miconazol, een werkzame stof van Daktozin, wordt minimaal geabsorbeerd door het lichaam als het wordt aangebracht op de huid.

Borstvoeding

Er is onvoldoende informatie over de uitscheiding van de werkzame bestanddelen van Daktozin in de moedermelk. Risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Er moet worden besloten of borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met Daktozin moet worden gestaakt dan wel niet moet worden ingesteld, waarbij het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling voor de vrouw in overweging moeten worden genomen.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. HOE GEBRUIKT U DAKTOZIN?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Openen van de tube:

- Draai het dopje los;

- Duw het dopje omgekeerd weer op de tube, totdat de scherpe punt de tube doorprijkt.

- De tube is klaar voor gebruik.

Daktozin wordt aangebracht op de volledige ontstoken oppervlakte bij elke luierswissel en na het bad. Alvorens de zalf aan te brengen, -- indien nodig -- de huid reinigen met lauw water en voorzichtig droog doppen. De zalf zachtjes aanbrengen met de vingertoppen (niet inwrijven).

Het gebruik van de zalf sluit de normale voorzorgsmaatregelen niet uit:

het gebruiken van niet-afsluitende (wegwerp) luiers en het veelvuldig verversen van de luiers zijn daarbij van groot belang. De ontstoken huid mag niet worden gereinigd met geparfumeerde zeep, shampoos of lotions.

U moet uw baby of peuter behandelen tot minimaal een week na het verdwijnen van alle tekens en symptomen.

Heeft u te veel van Daktozin gebruikt?

Er zijn geen gevallen van overdosering gekend. Indien jonge kinderen per ongeluk Daktozin zalf zouden innemen door de mond, kan bleekheid, braken en diarree optreden. U moet dan uw arts verwittigen.

Wanneer u te veel van Daktozin heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van Daktozin:

Immuunsysteemaandoeningen

Frequentie niet bekend: Overgevoeligheid, bij ernstige overgevoeligheid voor stoffen in het geneesmiddel kan een ernstige reactie optreden waarbij de bloedvaten plotseling zeer wijd worden,

met als gevolg dat de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie). Als u ademhalingsproblemen krijgt, ga dan met spoed naar een arts of ziekenhuis.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms (bij $\geq 1/1.000$ tot $< 1/100$ gebruikers): Huiduitslag

Frequentie niet bekend: Een brandend gevoel van de huid, roodheid.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, B-1060 Brussel (www.fagg.be; patientinfo@fagg-afmps.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DAKTOZIN?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Daktozin niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Daktozin?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn miconazolnitraat en zinkoxide. Elke gram zalf bevat 2,5 mg miconazolnitraat en 150 mg zinkoxide.
- De andere stoffen in dit middel zijn witte vaseline, trihydroxystearine, seringbloesemparfum.

Hoe ziet Daktozin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tube met 15 g en 90 g zalf voor cutaan gebruik.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Johnson & Johnson Consumer NV/SA

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Fabrikant

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

En

Johnson & Johnson Consumer NV/SA

Antwerpseweg 15-17

B- 2340 Beerse

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE155732

Afleveringswijze

Niet op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 05/2016