

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Aciclovir EG 50 mg/g crème Aciclovir

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt Aciclovir EG gebruikt?
2. Wanneer mag u Aciclovir EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Aciclovir EG?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Aciclovir EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Waarvoor wordt Aciclovir EG gebruikt?

Aciclovir EG is een geneesmiddel tegen virale infecties (antiviraal middel).

Aciclovir EG wordt gebruikt bij

- de behandeling van huidinfecties veroorzaakt door het herpes simplex virus bij patiënten zonder immuniteitsstoornissen.

2. Wanneer mag u Aciclovir EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Aciclovir EG niet gebruiken?

- U bent allergisch (overgevoelig) voor aciclovir, valaciclovir, propyleenglycol of voor één van de stoffen die in Aciclovir EG zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. (Zie eveneens rubriek 'Aciclovir EG bevat propyleenglycol en cetylalcohol').

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Aciclovir EG?

Informeer uw arts als u een of andere aandoening of ziekte heeft of heeft gehad in het verleden, in het bijzonder

- een ernstig verzwakt immuunsysteem, bijv.
 - aidspatiënten
 - mensen die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan.

In dat geval kan uw arts beslissen u tabletten voor te schrijven in plaats van crème.

- U mag geen Aciclovir EG gebruiken op de slijmvliezen (bijv. de mond, de ogen of de vagina) om lokale irritatie te vermijden. Accidenteel oogcontact dient ook te worden vermeden.
- Patiënten met herpes genitalis moeten zich seksueel onthouden zolang er laesies zichtbaar zijn teneinde overdracht van de infectie op de partner te vermijden.

- De ernst van de infectie wordt bepaald door verschillende factoren, bijv. de mate waarin het afweersysteem van uw lichaam reageert op de infectie, het aantal keren dat deze infectie optreedt, de duur van deze infecties en de mate waarin het virus infecties veroorzaakt in andere delen van het lichaam. Uw arts zal dan ook beslissen over de meest effectieve behandeling in uw geval, aangezien de behandeling kan variëren van patiënt tot patiënt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Aciclovir EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

De crème mag niet gemengd worden met andere substanties.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Aciclovir EG gebruikt.

Het gebruik van Aciclovir EG mag enkel overwogen worden als de potentiële voordelen opwegen tegen de mogelijke onbekende risico's. Er dient te worden opgemerkt dat de effecten van aciclovir crème op het hele lichaam heel waarschijnlijk te verwaarlozen zijn gezien de lokale applicatie op de huid.

Borstvoeding

Aciclovir gaat over in de moedermelk. Over de gevolgen daarvan is nog niet voldoende bekend. Neem daarom contact op met uw arts of apotheker als u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker altijd om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de effecten op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Een nadelig effect op deze activiteiten is echter onwaarschijnlijk.

Aciclovir EG bevat propyleenglycol en cetylalcohol

Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol en cetylalcohol. Het kan huidirritaties en lokale huidreacties (vb. contactdermatitis) veroorzaken.

3. Hoe gebruikt u Aciclovir EG?

Gebruik Aciclovir EG altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Aciclovir EG moet vijfmaal daags met tussenpozen van ongeveer 4 uren aangebracht worden op de geïnfecteerde huidoppervlakken, behalve 's nachts.

Aciclovir EG moet zo spoedig mogelijk na het begin van de infectie worden aangebracht op de laesies of de zich nog vormende laesies.

De behandeling moet worden voortgezet gedurende vijf dagen. Indien na vijf dagen de genezing niet volledig is kan de behandeling worden voortgezet voor een bijkomende periode van vijf dagen.

Breng de crème aan in een dunne laag op de aangetaste huidoppervlakken.

Als u de indruk heeft dat het effect van Aciclovir EG te sterk of te zwak is, raadpleeg uw arts of apotheker.

Heeft u teveel van Aciclovir EG gebruikt?

Wanneer u te veel van Aciclovir EG heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Indien u meer Aciclovir EG gebruikt heeft dan de aanbevolen hoeveelheid of indien overdosis of misbruik vermoed wordt, dient u uw arts te raadplegen, die over de nodige maatregelen zal beslissen.

Bent u vergeten Aciclovir EG te gebruiken?

Indien u nog maar onlangs vergeten bent de crème op uw huid aan te brengen, mag u de aanbevolen dosis crème alsnog aanbrengen. In alle andere gevallen dient u te wachten tot het tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis Aciclovir EG om een vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook Aciclovir EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ze kunnen in volgende frequenties optreden:

Zeer vaak	bij meer dan 1 op 10 patiënten
Vaak	bij meer dan 1 op 100, maar bij minder dan 1 op 10 patiënten
Soms	bij meer dan 1 op 1.000, maar bij minder dan 1 op 100 patiënten
Zelden	bij meer dan 1 op 10.000, maar bij minder dan 1 op 1.000 patiënten
Zeer zelden	bij minder dan 1 op 10.000 patiënten, met inbegrip van geïsoleerde gevallen

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: Onmiddellijke ernstige allergische reacties met inbegrip van angio-oedeem (zwellings van tong en/of gezicht) en urticaria (netelroos).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms: Voorbijgaand brandend of stekend gevoel op de plaats van applicatie, milde vorm van droge of afschilferende huid, jeuk.

Zelden: Huidreacties zoals erytheem, contactdermatitis na toediening.

De resultaten van de overgevoeligheidstests die werden uitgevoerd, hebben uitgewezen dat de reactieve bestanddelen meestal componenten van de crème waren en niet aciclovir zelf.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de website: www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Aciclovir EG?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Vervaldatum

Gebruik Aciclovir EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'EXP'. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Aciclovir EG?

- De werkzame stof in Aciclovir EG is aciclovir.
Eén gram crème bevat 50 mg aciclovir, equivalent aan 5 g aciclovir per 100 gram crème.
- De andere stoffen in Aciclovir EG zijn macrogolstearaat, dimeticon, cetylalcohol, vloeibare paraffine, witte vaseline, propyleenglycol, gezuiverd water.

Hoe ziet Aciclovir EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aciclovir EG is een geneesmiddel onder de vorm van een crème. Aciclovir EG bestaat onder de vorm van een aluminium tube met polyethyleen dop. De tubes bevatten 2, 3, 5, 10, 15 of 20 gram crème.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel

Fabrikant:

Stada Arzneimittel AG - Stadastraße, 2-18 - D-61118 Bad Vilbel - Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

BE Aciclovir EG 50 mg/g crème
DK Aciclodan creme, 50 mg/g
FI Acyclostad 50 mg/g kräm
FR Aciclovir 5 pour cent, crème
IT Aciclovir crema 50 mg/g
LU Aciclovir EG 50 mg/g crème
NL Acyclostad 50 mg/g crème
ES Aciclostad crema

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE199796

Afleveringswijze: op medisch voorschrift

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2015 / herzien in 02/2015.