

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

GLYCERINE SUPPO'S KELA ADULTES 2,4 g suppositoires

GLYCERINE SUPPO'S KELA BEBES ET ENFANTS 1,3 g suppositoires

Glycérine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale, néanmoins il est nécessaire d'employer Glycerine suppo's Kela soigneusement afin d'obtenir les meilleurs résultats.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est ce que Glycerine suppo's Kela et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Glycerine suppo's Kela?
3. Comment utiliser Glycerine suppo's Kela?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Glycerine suppo's Kela?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE GLYCERINE SUPPO'S KELA ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE?

Glycerine suppo's Kela sont des suppositoires pour usage rectal (administration par l'anus) qui favorisent le transit intestinal.

Ils peuvent être employés pour le soulagement temporaire d'une constipation passagère.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER GLYCERINE SUPPO'S KELA?

N'utilisez jamais Glycerine suppo's Kela

- si vous êtes allergique (hypersensible) à glycérine ou à l'un des autres composants contenus dans Glycerine suppo's Kela ;
- si vous avez une paralysie intestinale ou douleur abdominale dont l'origine est inconnue ;
- en cas de crise aiguë d'hémorroïdes, fissures anales, inflammation hémorragique du rectum.

Faites attention avec Glycerine suppo's Kela

- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique "Prise d'autres médicaments".
- Utilisez Glycerine suppo's Kela uniquement par voie rectale.
- Consultez immédiatement votre médecin si vous constatez des douleurs abdominales ou des effets anormaux.
- Ne pas utiliser de laxatifs plus d'une semaine sans avis médical.

- Eviter l'utilisation régulière de suppositoires à la glycérine. Si vous souffrez depuis longtemps de constipation, modifiez plutôt vos habitudes alimentaires ainsi que votre mode de vie.

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Utilisation d'autres médicaments

La résorption d'autres médicaments peut diminuer par l'utilisation concomitante d'autres médicaments.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Les suppositoires à la glycérine peuvent être utilisés pendant la grossesse et la lactation.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Il n'y a pas de données connues concernant l'effet de ce produit sur l'aptitude à conduire. Un effet n'est pas probable.

Informations importantes concernant certains composants de Glycerine suppo's

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER GLYCERINE SUPPO'S KELA ?

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin lors de l'emploi de Glycerine suppo's. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Adultes: introduire par jour 1 à 2 *suppositoires pour adultes* profondément dans l'anus. Après 5 à 30 minutes la défécation se produit.

Bébés et enfants: introduire par jour 1 à 2 *suppositoires pour bébés et enfants* profondément dans l'anus. Après 5 à 30 minutes la défécation se produit.

Eviter l'utilisation régulière de suppositoires à la glycérine. Si vous souffrez depuis longtemps de constipation, modifiez plutôt vos habitudes alimentaires ainsi que votre mode de vie.

Si vous avez utilisé plus de Glycerine suppo's Kela que vous n'auriez dû

Si une importante diarrhée se manifeste brusquement, il faut rétablir l'équilibre sel-eau du patient.

Si vous avez pris par la bouche de grosses quantités de suppositoires à la glycérine cela peut être toxique. Des maux de tête, nausées, soif, problèmes sanguins ou rénaux peuvent survenir. En cas de déshydratation l'équilibre sel-eau doit être rétabli.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Glycerine suppo's Kela, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Glycerine Kela suppo's

Ne pas applicable.

Si vous arrêtez d'utiliser Glycerine Kela suppo's

Ne pas applicable.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELLES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Glycerine suppo's peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Peu fréquent ($\geq 1/1000$, $< 1/100$): une sensation de brûlure autour du rectum

Consultez votre médecin si vous avez mal de ventre.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GLYCERINE SUPPO'S KELA?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Ne pas utiliser Glycerine Kela suppo's après la date de péremption mentionnée sur la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Ne pas utiliser Glycerine suppo's si vous remarquez que les suppositoires sont changé de couleur.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Glycerine Kela suppo's?

- La substance active dans Glycerine Kela suppo's pour adultes est 2,4 g glycérine.
- La substance active dans Glycerine Kela suppo's pour bébés et enfants est 1,3 g glycérine.
- Les autres composants sont gélatine et de l'eau.

Qu'est-ce que Glycerine Kela suppo's et contenu de l'emballage extérieur

Boîtes de 10 et 100 suppositoires pour adultes ou boîte de 10 et 100 pour bébés et enfants.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur la marché et fabricant

KELA Pharma nv/sa
Industriepark West 68
B-9100 SINT-NIKLAAS

Fabricant
Laboratoria Lambo
Simon De Heuvellaan 4
B-2110 Wijnegem

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Numéro d'autorisation de mise sur la marché

Glycerine suppo's Kela Bébé et enfants: BE212992.

Glycerine suppo's Kela Adultes: BE213001.

Statut légal de délivrance

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 03/2011.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 12/2014.