

## **EXTRAPAN IBUPROFENUM 5%, gel**

### **Ibuprofen**

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Waarvoor wordt Extrapan ibuprofenum gel gebruikt?
2. Wanneer mag u Extrapan ibuprofenum gel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Extrapan ibuprofenum gel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Extrapan ibuprofenum gel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

#### **1. WAARVOOR WORDT EXTRAPAN IBUPROFENUM GEL GEBRUIKT?**

Extrapan ibuprofenum gel behoort tot de groep van de niet-steroïde ontstekingsremmende middelen. Deze geneesmiddelen werken pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. Extrapan ibuprofenum gel is aangewezen als ondersteunende en symptomatische behandeling van:

- Peesontsteking (tendinitis) van de onderste en de bovenste ledematen.
- Goedaardige kwetsuren, ontstaan bij sport of door ongeval, verrekking, kneuzingen van de spieren en de pezen.

#### **2. WANNEER MAG U EXTRAPAN IBUPROFENUM GEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

**Wanneer mag u Extrapan ibuprofenum gel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek6.
- Als u allergisch bent voor andere geneesmiddelen van dezelfde groep of tegen aspirine.
- Op slijmvliezen of in de ogen.
- Bij zuigelingen en kleine kinderen.
- Op huidletsels waaruit vocht vrijkomt, op eczeem of op wonden.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Extrapan ibuprofenum gel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Indien U allergisch bent voor andere ontstekingsremmende middelen die niet afgeleid zijn van cortisone.
- De behandeling moet gestopt worden wanneer er huiduitslag optreedt.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Extrapan ibuprofenum gel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Er zijn geen wisselwerkingen van Extrapan ibuprofenum gel met andere geneesmiddelen bekend.

**Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?**

Wisselwerkingen van Extrapan ibuprofenum gel met voeding zijn tot op heden nog niet voorgekomen.

**Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Extrapan ibuprofenum gel wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap.

Extrapan ibuprofenum gel wordt niet aangeraden tijdens de borstvoeding.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Extrapan ibuprofenum gel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen en het gebruik van machines.

**3. HOE GEBRUIKT U EXTRAPAN IBUPROFENUM GEL?**

Gebruik Extrapan ibuprofenum gel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

3 à 4 maal per dag 4 tot 10 cm gel (afhankelijk van de grootte van het gewricht) aanbrengen op de huid en lichtjes masseren.

U mag de gel onder een afsluitend verband aanbrengen.

**Heeft u te veel van Extrapan ibuprofenum gel gebruikt?**

Wanneer de voorgeschreven hoeveelheid goed nagevolgd wordt, is een vergiftiging weinig waarschijnlijk omdat er via de huid relatief weinig werkzame stof opgenomen wordt (geringe lokale percutane resorptie) in vergelijking met de toediening via de bloedsomloop (systemisch).

Wanneer u Extrapan ibuprofenum gel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

**Bent u vergeten Extrapan ibuprofenum gel te gebruiken?**

Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig.

**Als u stopt met het gebruik van Extrapan ibuprofenum gel**

Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.**

Zoals elk geneesmiddel kan Extrapan ibuprofenum gel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In zeldzame gevallen werden huidreacties (droge huid), meestal plaatselijke roodheid, jeuk of een branderig gevoel vastgesteld. Stop in dit geval met het gebruik van dit geneesmiddel. Een verkramping van de spieren rond de luchtpijp (bronchospasme) of een ernstige allergische reactie (anafylactische shock) kan optreden.

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be) - e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. HOE BEWAART U EXTRAPAN IBUPROFENUM GEL?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Extrapan ibuprofenum gel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube/de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de

maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

## **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.**

### **Welke stoffen zitten er in Extrapan ibuprofenum gel**

- De werkzame stof in Extrapan ibuprofenum gel is ibuprofen 5 g.
- De andere stoffen in Extrapan ibuprofenum gel zijn isopropylalcohol – hydroxyethylcellulose – natriumhydroxide – benzylalcohol – gezuiverd water q.s. ad 100 g.

### **Hoe ziet Extrapan ibuprofenum gel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Extrapan ibuprofenum gel voor lokale toepassing, tube van 50 g en 100 g.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. – Rijksweg 9 – 2880 Bornem

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** BE221471

Vrije aflevering.

**Deze bijsluiter is goedgekeurd in 04/2017.**