

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

### Sinecod, 0,15%, siroop

Butamiraatcitraat

#### **Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie.**

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Waarvoor wordt Sinecod gebruikt?
2. Wanneer mag u Sinecod niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Sinecod?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sinecod?
6. Aanvullende informatie

#### **1. WAARVOOR WORDT SINECOD GEBRUIKT?**

Sinecod is een hoestsiroop voor oraal gebruik aangewezen om niet-productieve hoest te stillen.

#### **2. WANNEER MAG U SINECOD NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?**

##### **Wanneer mag u Sinecod niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- bij kinderen jonger dan 6 jaar.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Sinecod**

- Gelieve alvorens een geneesmiddel tegen de hoest te gebruiken, uw arts te raadplegen. Uw arts moet de oorzaak van de hoest vaststellen en deze met een gepast geneesmiddel behandelen. Indien de hoest aanhoudt, ondanks het geneesmiddel tegen de hoest, verhoog dan de voorgeschreven hoeveelheid niet zonder eerst uw arts te raadplegen. Een geneesmiddel tegen hoest mag niet gedurende langere periodes gebruikt worden.
- Door de remming van de hoestreflex door butamiraat (actief bestanddeel in Sinecod), moet het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen om slijm op te hoesten vermeden worden. Dit kan namelijk leiden tot ophoping van slijm in de longen, waardoor het risico op bronchospasmen (benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen) en luchtweginfecties kan toenemen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve dan ook de rubriek 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?' te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Sinecod nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Tot dusver werden geen wisselwerkingen gemeld.

**Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Tot dusver werden geen wisselwerkingen gemeld.

**Zwangerschap en borstvoeding**

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Het gebruik van Sinecod werd onvoldoende onderzocht bij zwangere vrouwen. Daarom mag u Sinecod niet gebruiken tijdens de eerste drie maanden van uw zwangerschap. Enkel op advies van uw arts en indien absoluut noodzakelijk, mag u tijdens de laatste zes maanden van uw zwangerschap Sinecod gebruiken.

Sinecod wordt best niet gebruikt wanneer u borstvoeding geeft.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Bij sommige personen kan het gebruik van Sinecod leiden tot slaperigheid. Wanneer dit bij u het geval is, wees dan voorzichtig tijdens het rijden of bij het gebruik van machines.

**Stoffen in Sinecod waarmee u rekening moet houden**

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis. Wegens de aanwezigheid van sorbitol en indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

**3. HOE GEBRUIKT U SINECOD?**

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 2/3 maatbekertje (10ml), tot maximaal 3 maal per dag;

Kinderen van 12 tot 16 jaar: 1 volledig maatbekertje (15 ml), tot maximaal 3 maal per dag;

Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar: 1 volledig maatbekertje (15 ml), tot maximaal 4 maal per dag.

De behandeling wordt gestopt na het verdwijnen van de symptomen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gelieve een arts te raadplegen als uw hoest langer dan 4 tot 5 dagen aanhoudt of als er koorts, kortademigheid of borstkaspijn aanwezig is.

Sinecod bevat geen suiker en kan dus worden gebruikt door suikerzieken.

**Heeft u te veel van Sinecod gebruikt?**

Wanneer u te veel van Sinecod heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Overdosering met Sinecod kan de volgende symptomen veroorzaken: slaperigheid, misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid en lage bloeddruk.

Volgende gebruikelijke behandeling wordt aanbevolen: maagspoeling, toediening van actieve koolstof, monitoring en behandeling van de levensbelangrijke functies indien nodig. Er is geen specifiek tegengif bekend.

#### **Bent u vergeten Sinecod te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

#### **Als u stopt met het gebruik van Sinecod**

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan Sinecod bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

#### Zenuwstelselaandoeningen:

Zelden ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1.000$ ): slaperigheid.

#### Maagdarmstelselaandoeningen:

Zelden ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1.000$ ): misselijkheid, diarree.

#### Huid- en onderhuidaandoeningen:

Zelden ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1.000$ ): huiduitslag.

#### Immuunsysteemaandoeningen:

Niet bekend: overgevoeligheidsreactie.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **5. HOE BEWAART U SINECOD?**

Bewaren beneden 30°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

## **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

### **Welke stoffen zitten in Sinecod?**

- Het werkzame stof in dit middel is butamiraatcitraat.  
Per 5 ml: 7,5 mg butamiraatcitraat.
- De andere stoffen in de middel zijn: Sorbitol 70% - Glycerol - Natriumsaccharinaat - Benzoëzuur - Vanilline - Ethanol - Natriumhydroxide - Gezuiverd water.  
Per 5 ml bevat Sinecod 12,5 mg ethanol 96°.

### **Hoe ziet Sinecod er uit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Siroop in een fles van 200 ml.  
1 maatbekertje van 15 ml.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.  
Site Apollo  
Avenue Pascal, 2-4-6  
B-1300 Wavre  
België

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE212195**

**Afleveringswijze: vrij.**

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 11/2016.**