

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS****TEEJEL, gel voor oromucosaal gebruik**

**Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger, Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. **Waarvoor wordt dit middel gebruikt?**
2. **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**
3. **Hoe gebruikt u dit middel?**
4. **Mogelijke bijwerkingen.**
5. **Hoe bewaart u dit middel?**
6. **Aanvullende informatie.**

**1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?**

Farmaceutische vorm : gel voor oromucosaal gebruik om lokaal in de mond aan te brengen, zonder in te slikken. Tube van 8 g en 30 g.

Geneesmiddelengroep : bevat:

- cholinesalicylaat: een geneesmiddel dat de pijnsymptomen kalmeert;
- cetalkoniumchloride: een ontsmettingsmiddel werkzaam tegen besmettingen door bacteriën.

Therapeutische indicaties : **verlichten van pijn aan tanden en tandvlees.**

**2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?****Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent **allergisch (overgevoelig)** voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- bij **etterige infecties, wonden of zweren** in de mond of van het tandvlees,
- in geval van **tandextracties, mondoperaties.**

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

- **Slik TEEJEL niet in en gebruik het niet met een ander geneesmiddel of een vloeistof voor de tanden.**
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.
- Bij ongewenste effecten of indien er geen verbetering is : de behandeling stopzetten en de dokter of de tandarts raadplegen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast TEEJEL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

**Gebruik geen TEEJEL** als u met een **anticoagulans** wordt behandeld (dit is een geneesmiddel om het bloed meer vloeibaar te maken).

#### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Niet van toepassing

#### **Zwangerschap en borstvoeding**

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Niet van toepassing

#### **Stoffen in dit middel waarmee U rekening moet houden**

Dit geneesmiddel bevat een **geringe hoeveelheid alcohol**, minder dan 100 mg per dosis.

### **3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosis en gebruiksaanwijzing nauwkeurig volgen : de behandelingsduur niet verlengen zonder advies van de dokter of de tandarts.

#### **TEEJEL op het gevoelige en pijnlijke gedeelte in de mond of van het tandvlees aanbrengen.**

Niet te hard wrijven of drukken. Niet inslikken.

#### **De gebruikelijke dosering is:**

Bij kinderen van 6 maanden tot 1 jaar : ½ cm gel 1 à 3 maal per dag of volgens advies van de dokter of de tandarts.

Bij kinderen van 1 jaar tot 6 jaar : ½ à 1 cm gel 1 à 3 maal per dag of volgens advies van de dokter of de tandarts.

Bij kinderen ouder dan 6 jaar en bij volwassenen : 1 cm gel 1 à 6 maal per dag of volgens advies van de dokter of de tandarts. Het maximaal aantal toedieningen mag niet hoger zijn dan 8 à 10 applicaties per dag.

De hoeveelheid gel per toediening mag niet meer dan 1 cm bedragen.

Uw arts zal u meedelen hoe lang u TEEJEL moet gebruiken. De behandeling niet voortijdig stopzetten.

#### **Heeft u teveel van dit middel gebruikt?**

Wanneer u te veel TEEJEL heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of tandarts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Aangezien TEEJEL lokaal wordt aangebracht verwacht men normaal geen ongewenste effecten. Toch moet men rekening houden met de hoger vermelde maximale dosering.

Een vergiftiging met salicylaat (één van de actieve bestanddelen) bekend onder de naam van salicylisme, kan zich voordoen bij de toediening van hoge dosissen of bij een langdurige behandeling. De meest voorkomende ziekteverschijnselen zijn dan:

- hoofdpijn,
- duizeligheid,
- oorsuizen,
- gehoorsstoornissen,

- slaperigheid,
- zweten,
- braken,
- diarree,
- hyperventilatie (overdreven ademhaling)

Een ergere graad van vergiftiging door salicylaten kan leiden tot:

- stoornissen in het functioneren van het zenuwstelsel,
- een wijziging in de samenstelling van het bloed,
- een abnormale stijging van de temperatuur,
- uitdrogingsverschijnselen

#### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar neem de volgende dosis op het gepaste ogenblik.

#### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om de behandeling te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan TEEJEL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij bepaalde, zeer gevoelige patiënten, zou **allergie** kunnen optreden. Deze allergie manifesteert zich over het algemeen door een gevoel van omkeerbare branderigheid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL ?**

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.  
Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking EX. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

#### **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

##### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stoffen in dit middel zijn

- cholinesalicylaat en
- cetalkoniumchloride.

De andere bestanddelen in dit middel zijn :

- methylcellulose
- glycerol
- ethanol
- anijsextract
- menthol

- natriumcyclamaat
- zoutzuur
- gezuiverd water

**Hoe ziet TEEJEL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

TEEJEL is een gel voor oromucosaal gebruik (gebruik in de mondholte) in een tube van 8 g en 30 g.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Meda Pharma  
Terhulpssteenweg 166  
1170 Brussel  
België

**Fabrikant:**

SANICO  
Industriezone 4  
Veedijk 59  
2300 Turnhout  
België

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** BE007944

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

**Afleveringswijze :** vrije aflevering

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2011.