

DIT IS EEN GENEESMIDDEL. DE BIJSLUITER AANDACHTIG LEZEN.

BENAMING

PRIODERM

SAMENSTELLING

Malathion 5 mg - Terpeneol - Dipenten. - Aroma synth. Pine Siberian (Derog. 42/790) - Isopropanol. q.s. ad 1 ml.

FARMACEUTISCHE VORM EN VERPAKKING

Haarlotion 0,5% w/v. Flacon met 100 ml.

FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP

Vloeibaar geneesmiddel voor uitwendig gebruik tegen luizen en neten.

REGISTRATIEHOUDER

Meda Pharma n.v. – Terhulpesteenweg 166 – 1170 Brussel

FABRICANT

Vemedia Manufacturing – Diemen (NL)

AANGEWEZEN BIJ

De lokale behandeling van hoofd- of schaamhaar bij besmetting met luizen en neten.

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN VERMEDEN

Allergie aan een van de bestanddelen van het geneesmiddel.

BIJZONDERE VOORZORGEN - ONVERENIGBAARHEDEN

PRIODERM is een vloeibaar geneesmiddel voorbehouden voor de uitwendige behandeling van hoofd- en schaamhaar geïnfesteerd door luizen.

Niet innemen, noch mengen met een geneesmiddel of een andere vloeistof.

Zoals alle geneesmiddelen tegen luizen, moet **PRIODERM** zeer voorzichtig gebruikt worden, omdat het een ontvlambare en giftige vloeistof is.

- Zorg dragen bij toepassing en flacon goed sluiten na gebruik.
- Handen goed wassen na toepassing.
- De aanbevolen dosering en gebruiksaanwijzing nauwkeurig volgen.
- Contact met de ogen vermijden door een doekje vóór de ogen te plaatsen.
- De behandelde haren niet bedekken om huidresorptie te vermijden (geen hoofddekseel dragen en geen haardroger gebruiken).
- Niet inademen.
- Niet dicht bij een vlam gebruiken.
- Bijzonder toezicht houden bij de behandeling van jonge kinderen.
- **PRIODERM** buiten bereik van kinderen bewaren.

GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Toepassing van **PRIODERM** tijdens zwangerschap en borstvoeding vermijden, behalve op gunstig doktersadvies.

HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL

Het droog haar besprenkelen met 10 tot 20 ml lotion, naargelang het haarvolume. Op natuurlijke wijze laten drogen. Gebruik van een kunstmatige warmtebron (haardroger) vermijden, wegens de ontvlambaarheid van het product.

Ongeveer 12 uur na de behandeling, het haar wassen en met een fijne kam kammen.

Het schaamhaar op dezelfde manier behandelen.

Eén enkele toepassing van **PRIODERM** volstaat normalerwijze. In geval van onvoldoende resultaat of van nieuwe besmetting, de behandeling 7 à 9 dagen nadien herbeginnen.

TOEDIENINGSWIJZE EN AFLEVERING

Haarlotion. Uitwendig gebruik. Verkrijgbaar in de apotheek zonder doktersvoorschrift.

MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN

Bij toevallige inname, doen braken, actieve kool en een laxerend middel toedienen. Waarschuw de dokter, het ziekenhuis of het antigifcentrum 070/245.245.

Tegengif :

atropine :

bij volwassenen : 2 à 5 mg in langzaam I.V. infuus

bij kinderen : 0,2 mg/kg I.V. infuus

pralidoxim (1-2 g intra-musculaire inspuiting)

ONGEWENSTE EFFECTEN

Gebeurlijk, lokale roodheid, afschilferende huid, oog- en slijmvliesirritatie.

Zeer zelden werd een allergische huidreactie vastgesteld.

Bij optreden van een bijwerking (irritatie, allergie, ...) de behandeling stopzetten en de dokter raadplegen.

Informeer uw arts of uw apotheker in geval zich ongewenste effecten voordoen die niet in de bijsluiter vermeld zijn.

BEWARING

Koel bewaren (8-15° C) en tegen vuur beschermen.

Zie de vervaldatum "EX" vermeld op de verpakking (maand, jaar).

LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER

februari 2007

Under licence from MUNDIPHARMA, Basel/Switzerland
152 IS 303 F 11