

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

**Piracetam EG 800 mg filmomhulde tabletten**  
**Piracetam EG 1200 mg filmomhulde tabletten**  
**Piracetam EG 1200 mg poeder voor drank**  
**Piracetam EG 2400 mg poeder voor drank**  
Piracetam

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Piracetam EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u Piracetam EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Piracetam EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Piracetam EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. Wat is Piracetam EG en waarvoor wordt het ingenomen?**

Piracetam EG is aangewezen voor de verbetering van symptomen waargenomen bij pathologische geheugenstoornissen of intelligentiestoornissen zonder dat dementie werd vastgesteld. Piracetam EG kan, bij bepaalde patiënten, corticale myoclonieën (onwillekeurige spiersamentrekkingen) doen verminderen. Om de respons op het geneesmiddel te testen, kan men dus voor een beperkte periode een proefbehandeling instellen.

### **2. Wanneer mag u Piracetam EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

#### **Wanneer mag u Piracetam EG niet innemen?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel of voor andere pyrrolidonederivaten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u een hersenbloeding heeft
- Als u lijdt aan terminale nierinsufficiëntie
- Als u lijdt aan chorea van Huntington

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Piracetam EG?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Piracetam EG inneemt:

- Als uw nieren slecht werken. Aangezien piracetam vrijwel uitsluitend door de nieren wordt uitgescheiden, kan uw arts de dosering aanpassen aan uw nierfunctie.
- Als u risico op ernstige bloedingen heeft
- Als u lijdt aan myoclonie (onwillekeurige spiersamentrekking) mag u de behandeling niet plots stopzetten.

#### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar.**

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

#### **Neemt u nog andere geneesmiddelen in?**

Neemt u naast Piracetam EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat

Bijsluiter

dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit betreft vooral schildklierextracten of bloedverdunnende producten.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Piracetam EG mag niet worden toegediend tijdens de zwangerschap noch tijdens het geven van borstvoeding, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Piracetam gaat doorheen de placentabarière en wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

### **Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?**

Geen bijzonderheden.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Men moet er rekening mee houden dat Piracetam EG een invloed kan hebben op de rijvaardigheid of op het bedienen van machines.

### **Piracetam EG bevat:**

Piracetam EG filmomhulde tabletten bevat zonnegeel FCF (E110): kan allergische reacties veroorzaken.

Piracetam EG poeder voor drank bevat mannitol (E421): kan een licht laxerende werking hebben vanaf een dagelijkse inname van 9 g piracetam of meer.

Piracetam EG poeder voor drank bevat ook aspartaam (E951) wat een bron van fenylalanine bevat. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

## **3. Hoe neemt u Piracetam EG in?**

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dagdosis, de toedieningsvorm en het aantal innamen zullen door de geneesheer bepaald worden naargelang de aandoening en de verschillende stadia in de behandeling.

De aanbevolen dosissen in gram (voor een volwassene met 70 kg lichaamsgewicht) naargelang de verschillende indicaties worden hieronder weergegeven; de overeenkomstige hoeveelheden tussen de verschillende vormen worden in een overzichtstabel op het einde van de rubriek vermeld.

1. Bij de behandeling van geheugen- en/of intelligentiestoornissen bedraagt de aanvangsdosis gedurende de eerste weken van de behandeling 4,8 g per dag verdeeld over verschillende toedieningen; daarna een onderhoudsbehandeling van 2,4 g per dag verdeeld over 2 tot 3 toedieningen, eventueel de dosis verminderen tot 1,2 g per dag.
2. Bij de behandeling van corticale myoclonieën zal de dosis individueel aangepast worden door de arts. Er wordt gestart met een dagelijkse dosis van 7,2 g, die elke 3 tot 4 dagen verhoogd kan worden met 4,8 g tot een maximum van 24 g, verdeeld over 2 of 3 innames.

VORMEN	DAGELIJKSE DOSIS			
	1,2 g	2,4 g	4,8 g	7,2 g
omhulde tabletten 800 mg		3 x 1	3 x 2	
omhulde tabletten 1200 mg	1 x 1	2 x 1	2 x 2	3 x 2
poeder voor drank 1200 mg	1 x 1	2 x 1	2 x 2	3 x 2
poeder voor drank 2400 mg		1 x 1	2 x 1	

### *Patiënten met nierproblemen en bejaarden*

Bij patiënten met nierproblemen dient de dosis te worden aangepast afhankelijk van de nierfunctie.

Bijsluiter

Bij langdurige behandeling van bejaarden dient de nierfunctie regelmatig gecontroleerd te worden en zo nodig de dosis aangepast te worden.

*Patiënten met leverproblemen*

Er is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met leverproblemen.

Piracetam EG filmomhulde tabletten dient ingenomen te worden met wat vloeistof, met of zonder voedsel. Piracetam EG poeder voor drank dient eerst te worden opgelost in een half glas water alvorens ingenomen te worden.

#### **Heeft u te veel van Piracetam EG ingenomen?**

Tot op heden werden geen bijkomende effecten gerapporteerd specifiek te wijten aan een overdosering.

De maag kan geledigd worden door maagspoeling of door braken.

Wanneer u te veel van Piracetam EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

#### **Bent u vergeten Piracetam EG in te nemen?**

Zoals voor elk geneesmiddel, is het belangrijk dat u Piracetam EG regelmatig inneemt gedurende de hele behandeling. Indien u vergeten bent uw geneesmiddel in te nemen, herneem dan uw behandeling zo vlug mogelijk zonder evenwel de hoeveelheden, noch het aantal innamen te wijzigen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Indien u behandeld wordt voor myoclonieën, neem dan contact met uw arts. Deze zal u zeggen wanneer u de volgende dosis moet innemen.

#### **Als u stopt met het innemen van Piracetam EG**

Indien u aan myoclonieën lijdt en plots uw behandeling stopzet, hebt u een hoger risico op myoclonieën of veralgemeende stuipen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

Volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Vaak (bij 1 tot 10 patiënten op 100):

- zenuwachtigheid
- moeilijk stil kunnen zitten (hyperkinesie)
- gewichtstoename

Soms (bij 1 tot 10 patiënten op 1.000):

- depressie
- slaperigheid
- zwakte

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- bloedingsstoornis
- allergische reacties
- opwinding, angst, verwardheid, hallucinatie
- niet-gecoördineerde bewegingen (ataxie), evenwichtsproblemen, verergering van bestaande epilepsie, hoofdpijn, slaapstoornissen

Bijsluiter

- duizeligheid
- buikpijn, hoge buikpijn, diarree, misselijkheid, braken
- jeuk, huiduitslag, netelroos, angioedeem

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u Piracetam EG?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking, blisterverpakking of het zakje na "EXP". Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in Piracetam EG?**

De werkzame stof in Piracetam EG is piracetam overeenkomend met respectievelijk 800 mg en 1200 mg per filmomhulde tablet en 1200 mg en 2400 mg per zakje poeder voor drank.

De andere stoffen in Piracetam EG zijn:

*Filmomhulde tabletten 800 mg:*

Macrogol 6000, Colloïdaal watervrij siliciumdioxide, Magnesiumstearaat, Opadry oranje OY-S-33071

*Filmomhulde tabletten 1200 mg:*

Macrogol 6000, Colloïdaal watervrij siliciumdioxide, Magnesiumstearaat, Opadry oranje OY-S-33071

*Poeder voor drank 1200 mg:*

Mannitol (E421), watervrij citroenzuur, Aspartaam (E951), Aroma (capsaroma sinaasappel)

*Poeder voor drank 2400 mg:*

Mannitol (E421), watervrij citroenzuur, Aspartaam (E951), Aroma (capsaroma sinaasappel)

### **Hoe ziet Piracetam EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

*800 mg filmomhulde tabletten:*

Oranje, langwerpige filmomhulde tabletten  
60, 120 filmomhulde tabletten

*1200 mg filmomhulde tabletten:*

Oranje, langwerpige filmomhulde tabletten met breukstreep aan beide zijden  
56, 112 filmomhulde tabletten

*1200 mg poeder voor drank:*

Wit poeder met sinaasappelgeur

Bijsluiter

56, 112 zakjes poeder voor drank

*2400 mg poeder voor drank:*

Wit poeder met sinaasappelgeur

28, 56, 112 zakjes poeder voor drank

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:*

Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel

*Fabrikant filmomhulde tabletten:*

Sanico NV - Veedijk 59- 2300 Turnhout

*Fabrikant poeder voor drank:*

Laboratoria Smeets - Fotografielaan 42 - 2610 Wilrijk

**Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:**

Piracetam EG 800 mg filmomhulde tabletten: BE151006

Piracetam EG 1200 mg filmomhulde tabletten: BE183985

Piracetam EG 1200 mg poeder voor drank: BE254913

Piracetam EG 2400 mg poeder voor drank: BE254922

**Afleveringswijze:** op medisch voorschrift.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd/herzien in 09/2015 / 09/2015.**