

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

UPSA-C 1000 mg, comprimés effervescents

Acide ascorbique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents ?
3. Comment prendre UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE UPSA-C 1000 MG COMPRIMES EFFERVESCENTS ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Le traitement et la prévention d'un manque de vitamine C.

Cette insuffisance peut être due à:

- une alimentation mal équilibrée
- une absorption réduite en cas de maladie de l'estomac ou des intestins
- une augmentation des besoins en vitamine C dans certaines circonstances telles que la grossesse ou l'allaitement

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE UPSA-C 1000 MG COMPRIMES EFFERVESCENTS ?

Ne prenez jamais UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents

- Si vous êtes allergique à l'acide ascorbique ou à l'un des autres composants contenus dans UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous souffrez d'hyperoxalurie (excrétion accrue d'oxalate dans les urines), ou d'hypersensibilité à l'un des constituants du médicament.

Avertissements et précautions

- Si vous souffrez de, ou si vous êtes sujet aux, calculs rénaux, consultez votre médecin ; Des doses élevées en vitamines ne sont pas recommandées.
- Si vous souffrez de troubles du métabolisme du fer ; Des doses élevées en vitamines ne sont pas recommandées.

- Si vous souffrez d'un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase ; Des doses élevées en vitamines ne sont pas recommandées.
- En cas de régime pauvre en sel, il convient de savoir qu'un comprimé d'UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents contient 0,283 gramme de sodium et en tenir compte dans la ration journalière.
- Ce médicament peut interférer avec des tests de laboratoire. Si des analyses de sang ou d'urine vous sont prescrites, avertissez votre médecin de la prise de ce médicament.

En raison de sa légère action stimulante, il est souhaitable de ne pas prendre ce médicament en fin de journée

De fortes doses de vitamine C peuvent modifier les résultats des analyses de sang ou d'urine. De même, il peut exister une interaction entre des doses élevées de vitamine C et certains médicaments (comme les barbituriques, les dérivés salicylés et sulfamides).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre UPSA-C.

Enfants

Cette présentation n'est pas adaptée aux enfants.

Autres médicaments et UPSA-C

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

UPSA-C avec des aliments et boissons

Sans objet

Fertilité, Grossesse et allaitement

La vitamine C passe dans la circulation sanguine du fœtus depuis la circulation sanguine maternelle. L'utilisation d'UPSA-C durant la grossesse n'est pas recommandée sauf sous la supervision d'un médecin.

L'acide ascorbique est excrété dans le lait maternel et des effets chez les nouveau-nés/nourrissons sont probables. Une décision doit être prise soit d'interrompre l'allaitement soit d'interrompre/de s'abstenir du traitement avec UPSA-C en prenant en compte le bénéfice de l'allaitement pour l'enfant au regard du bénéfice du traitement pour la femme.

Les données n'apportent pas d'indication de déficience de la fertilité.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet

UPSA-C contient du saccharose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

UPSA-C contient un agent colorant azoïque (E 110 jaune orangé) et peut provoquer des réactions allergiques.

3. COMMENT PRENDRE UPSA-C 1000 MG COMPRIMES EFFERVESCENTS ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Prise par la bouche après dissolution dans un verre d'eau.

La dose recommandée est ½ à 1 comprimé d'UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents par jour, à prendre le matin ou au milieu de la journée. Dissoudre les comprimés dans un verre d'eau.

Le comprimé peut être divisé en doses égales.

Si vous avez pris plus de UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents que vous n'auriez dû

La prise de très fortes doses de vitamine C peut provoquer des effets tels que de la diarrhée, des nausées et des vomissements.

Il peut aussi survenir une rougeur du visage, des maux de tête et des troubles urinaires (augmentation de la quantité d'urine, calculs rénaux, sang dans les urines chez certains patients).

L'excédent de vitamine C est rapidement éliminé par les urines.

Si vous avez utilisé ou pris trop d'UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents

Sans objet

Si vous arrêtez de prendre UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents est bien toléré aux doses recommandées.

De fortes doses de vitamine C peuvent occasionner de la diarrhée et, chez les personnes prédisposées, favoriser l'apparition de pierres aux reins.

Si la vitamine C est prise à fortes doses (2 à 3 g), pendant une longue période, un effet de sevrage peut survenir à l'arrêt du traitement.

La prise prolongée de "chewing-gum" à la vitamine C a été associée à des cas d'érosion de l'émail dentaire.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec une fréquence non déterminée:

Affections du système nerveux: vertiges

Affections gastro-intestinales: douleurs abdominales, diarrhée

Affections de la peau: éruptions cutanées avec démangeaisons intenses et urticaires

Affections du rein et des voies urinaires: excrétion rénale d'oxalate accrue (hyperoxalurie), coloration anormale de l'urine (chromaturie)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement (voir détails ci-dessous). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Belgique

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxembourg

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

5 COMMENT CONSERVER UPSA-C 1000 MG COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents

- La substance active est l'Acide ascorbique
- Les autres composants sont : Bicarbonate de sodium ; Acide citrique anhydre ; Saccharose ; Saccharinate de sodium ; Polyéthylène glycol 6000 ; Benzoate de sodium (E211) ; Arôme orange 87 56 28 ; Jaune orangé S (E110) ; Eau purifiée. Voir Rubrique 2 UPSA-C contient du saccharose, du sodium et un colorant azoïque.

Aspect de UPSA-C 1000 mg comprimés effervescents et contenu de l'emballage extérieur

- La forme pharmaceutique et les autres présentations
Comprimés effervescents aromatisés à l'orange.
Tubes en polypropylène, boîtes de 1 ou 2 tubes de 10 comprimés

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché
Bristol-Myers Squibb Belgium SA
Chaussée de la Hulpe, 185
1170 BRUXELLES

Fabricant
UPSA
304, av. du Docteur Jean Bru
47000 Agen - France

UPSA
979, av. des Pyrénées
47520 Le Passage - France

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché :
BE 033205

Mode de délivrance :
Délivrance libre

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 09/2016.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 01/2017