

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

## **Corsodyl 10 mg/g, gel voor dentaal gebruik**

chloorhexidinedigluconaat

### **Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Corsodyl Gel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Corsodyl Gel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

- Corsodyl tandgel bevat chloorhexidinedigluconaat. Deze stof doodt de meeste soorten bacteriën en ook bepaalde schimmels.
- Corsodyl tandgel wordt gebruikt:
  - voor de behandeling van tandvleesontstekingen.
  - na parodontale ingrepen om genezing van het tandvlees te bevorderen.
  - voor de behandeling van terugkerende zweren en mondinfecties veroorzaakt door candida (bijvoorbeeld stomatitis en aften).
  - om cariës te voorkomen, wanneer gebruikelijke methodes niet volstaan. De gelijktijdige behandeling van de onderliggende oorzaak is noodzakelijk.

#### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor chloorhexidinedigluconaat of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Gebruik dit middel alleen in de mond.
- Vermijd elk contact van Corsodyl tandgel met de ogen en oren. Als de gel toch in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk en overvloedig met water.
- Hoewel er geen nadelige effecten bekend zijn ten gevolge van inslikken, mag Corsodyl tandgel niet worden doorgeslikt. Het gebruik ervan bij kleine kinderen wordt daarom afgeraden.
- In geval van allergische reacties (zoals pijn, zwelling of irritatie in de mond) moet de behandeling worden stopgezet en moet een arts of apotheker worden geraadpleegd.

### **Kinderen**

Raadpleeg een arts of apotheker vóór gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.

---

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Corsodyl tandgel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen aanwijzingen dat gelijktijdig gebruik van Corsodyl tandgel en andere geneesmiddelen problemen veroorzaakt.

### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Het gelijktijdige gebruik van Corsodyl met kleurvormende stoffen, zoals thee, koffie en wijn, kan leiden tot een bruine verkleuring van tong en tanden (zie ook "Mogelijke bijwerkingen"). De verkleuring van de tong verdwijnt zodra men stopt met de behandeling. De verkleuring van de tanden kan grotendeels worden voorkomen door de tanden te poetsen met een normale tandpasta en door de mond met water te spoelen voordat men Corsodyl gebruikt, en door het gebruik van kleurvormende stoffen te verminderen. Wanneer het gebruik van een tandpasta niet volstaat of onmogelijk is, kan tandsteenverwijdering of polijsten van de tanden nuttig zijn.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Wanneer de gebruiksinstructies in acht wordt genomen, kan Corsodyl tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode worden gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Corsodyl tandgel heeft geen effect op het vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen, want het product wordt niet door het lichaam geabsorbeerd (ook niet wanneer het per ongeluk wordt ingeslikt).

## **3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Omdat veel normale tandpasta's stoffen bevatten die niet samen met Corsodyl kunnen worden gebruikt, moet u na het tanden poetsen de mond spoelen voordat u Corsodyl gebruikt.

#### Behandeling van tandvleesproblemen;

Poets uw tanden gedurende 2 weken tweemaal per dag met 2,5 cm Corsodyl tandgel die u op de tandenborstel aanbrengt. Poets minstens 1 minuut of volg het advies van de arts of de tandarts.

#### Behandeling van aften;

Breng met behulp van de wijsvinger tweemaal per dag 2,5 cm Corsodyl tandgel aan op en rond de aften aan.

#### Om tandcariës te voorkomen

De tandarts zal een voorgevormd gootje maken dat is aangepast aan de tanden. Breng 2,5 cm Corsodyl tandgel in het gootje aan en plaats het dagelijks 5 minuten tegen de tanden, bij voorkeur 's avonds. Gebruik het middel gedurende 2 weken en herhaal de behandeling eventueel na 3 tot 4 maanden. Tegelijkertijd zijn andere preventieve maatregelen noodzakelijk, zoals vermindering van het gebruik van suiker en het tweemaal daags poetsen van de tanden met een fluoridehoudende tandpasta.

#### Bij de behandeling van stomatitis door Candida onder de gebitsprothese

Breng ongeveer 2 cm Corsodyl tandgel aan ter hoogte van de binnenwelling van de prothese. Houd de prothese gedurende 10 minuten in de mond en spoel daarna de mond en de prothese.

### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Wanneer u te veel Corsodyl tandgel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245-245).

---

### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Wanneer u vergeten bent Corsodyl tandgel te gebruiken, gebruik het dan alsnog en ga verder met de behandeling zoals beschreven in “Hoe gebruikt u dit middel?”.

### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

#### Allergische reacties:

- Stop met het gebruik van Corsodyl tandgel en zoek onmiddellijk medische hulp als u last krijgt van huiduitslag (netelroos), zwelling van lippen, tong, keel of het gezicht of wanneer u moeite heeft met ademen (dyspneu). Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige allergische reactie die zeer zeldzaam is.

#### Mondholte:

- Aan het begin van de behandeling kan de smaak verstoord raken. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze aanhouden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- In geval van herhaald gebruik kan een bruine verkleuring van de tong en de tanden (incl. vullingen en prothesen) optreden. De verkleuring van de tong verdwijnt zodra de behandeling wordt stopgezet. In rubriek 2 onder “Waarop moet u letten met eten en drinken?” leest u hoe u dit kunt voorkomen.

#### Huid:

- Huidirritatie.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten  
Afdeling Vigilantie  
EUROSTATION II  
Victor Hortaplein, 40/ 40  
B-1060 Brussel  
Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be)  
e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.  
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C).

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

### **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

#### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof in dit middel is chloorhexidinedigluconaat.

- 
- De andere stoffen in dit middel zijn pepermuntolie, levomenthol, polyoxyl hydrogenated castor oil (= PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie ), isopropylalcohol, natriumacetaat, hydroxypropylcellulose en gezuiverd water.

**Hoe ziet Corsodyl tandgel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

- Corsodyl tandgel is een doorzichtige gel.
- Corsodyl tandgel is verkrijgbaar in een tube met 50 g gel.

**Afleveringswijze:**

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Site Apollo

Avenue Pascal, 2- 4- 6

1300 Wavre

**Fabrikant:**

BCM Limited

Thane Road, Nottingham

Nottinghamshire NG 2 3AA

Verenigd Koninkrijk

Purna Pharmaceuticals nv,

Rijksweg 17,

2870 Puurs,

België

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:**

Corsodyl 10 mg/g, gel voor dentaal gebruik: BE104973

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2016**