

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

LACRINORM 2 mg/g gel ophtalmique

Carbomère 980

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Lacrinorm et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lacrinorm ?
3. Comment utiliser Lacrinorm ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Lacrinorm ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE LACRINORM ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Lacrinorm contient une substance active, le carbomère. Ce médicament est un gel pour l'oeil. Il est utilisé pour traiter la sécheresse de l'œil. Il humidifie et lubrifie temporairement la surface de l'oeil. Lacrinorm peut également être utilisé comme lubrifiant artificiel des lentilles de contact dures, et assure ainsi le confort pendant une période prolongée.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT D'UTILISER LACRINORM ?

N'utilisez jamais Lacrinorm

si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6, comme l'agent conservateur chlorure de benzalkonium.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Lacrinorm .

- Vous ne devez pas toucher votre œil avec l'embout du tube.
- Vous ne devez ni injecter, ni avaler ce médicament.
- En cas d'allergie, vous devez arrêter le traitement.

Si vous portez des lentilles de contact souples

Évitez le contact entre Lacrinorm et les lentilles de contact souples, car ce médicament contient un agent conservateur : le chlorure de benzalkonium.

Lisez aussi le paragraphe ‘Lacrinorm contient du chlorure de benzalkonium’ à la fin de la rubrique 2.

Enfants et adolescents jusqu’à 18 ans

La sécurité et l’efficacité de Lacrinorm chez l’enfant et l’adolescent à la posologie recommandée chez l’adulte a été établie en fonction de l’expérience clinique, mais aucune donnée d’essai clinique n’est disponible.

Autres médicaments et Lacrinorm

Il n’y a pas d’interaction connue. Si vous utilisez un collyre en même temps que Lacrinorm, vous devez espacer les utilisations de 15 minutes.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse, allaitement et fécondité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Si après avoir utilisé ce gel, vous ressentez une gêne au niveau des yeux ou si votre vision se trouble, vous ne devez pas conduire un véhicule ou utiliser une machine jusqu’à la fin des symptômes. Ces effets s’atténuent au bout de quelques heures.

Lacrinorm contient du chlorure de benzalkonium

Le chlorure de benzalkonium peut provoquer une irritation des yeux.

Évitez le contact avec les lentilles de contact souples car le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souples. Retirez les lentilles de contact avant d’appliquer Lacrinorm et attendez au moins 15 minutes avant de les remettre.

3. COMMENT UTILISER LACRINORM

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 1 goutte dans chaque œil, 2 à 4 fois par jour, et à chaque fois que les symptômes de l’œil sec se font sentir. Attendez au moins 40 minutes entre chaque instillation.

Mode d’administration



Ce médicament doit être appliqué au niveau de l’œil.

Lors de l’utilisation de ce gel, veuillez respecter les étapes suivantes :

1. Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler le gel.

2. Evitez le contact de l'embout du tube avec l'œil ou les paupières. Tirez légèrement la paupière inférieure vers le bas en regardant en haut.
3. Déposez une goutte de gel dans l'espace formé.
4. Rebouchez le tube.

Enfants et adolescents jusqu'à 18 ans

La sécurité et l'efficacité de Lacrinorm chez l'enfant et l'adolescent à la posologie recommandée chez l'adulte a été établie en fonction de l'expérience clinique, mais aucune donnée d'essai clinique n'est disponible.

Si vous avez utilisé plus de Lacrinorm que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de Lacrinorm, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Lacrinorm

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Instiller la dose oubliée dès que possible. Toutefois, si le moment est presque venu de prendre la dose suivante, omettez la dose oubliée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut avoir des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets suivants peuvent survenir :

- un trouble visuel passager après l'application du gel (dû à la consistance du gel)
- hyperémie (augmentation du flux sanguin)
- sensation de brûlure
- prurit (démangeaisons)

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER LACRINORM

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Après ouverture, vous pouvez conserver le tube pendant 30 jours maximum.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage/tube après la mention « ex ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Lacrinorm

- La substance active est le carbomère 980 : 2 mg par g de gel.
- Les autres composants sont l'hydroxyde de sodium, le sorbitol, l'eau purifiée et le chlorure de benzalkonium.

Aspect de Lacrinorm et contenu de l'emballage extérieur

Tube de 5 g ou de 10 g.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Bausch&Lomb Pharma sa
Bvd. Lambermont 430
1030 Bruxelles

Fabricant

Laboratoire Chauvin
ZI Ripotier Haut
07200 Aubenas
France

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165 - 173
13581 Berlin (Spandau)
Allemagne

Numéro de l'Autorisation de mise sur le marché

BE 193365

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2016.