

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BAREXAL 3 g/0,125 g poeder voor orale suspensie

dioctaëdrisch smectiet, aluminiumhydroxide en magnesiumcarbonaat gedroogde gel

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts .

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Barexal en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Barexal niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Barexal?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Barexal?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS BAREXAL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Barexal bevat als werkzame stoffen dioctaëdrisch smectiet, aluminiumhydroxide en magnesiumcarbonaat. Ze verminderen diarree door prikkelende stoffen te binden en de darm ertegen te beschermen.

Barexal wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen van acute diarree bij volwassenen en kinderen.

2. WANNEER MAG U BAREXAL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Barexal niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U lijdt aan een ernstig verminderde werking van de nieren.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Barexal?

- Als u vaak een nierdialyse moet ondergaan (behandeling met kunstnier), mag u Barexal niet langdurig gebruiken omwille van het risico op een hersenaandoening (encefalopathie).
- Barexal bevat het suiker glucose. Gebruik dit geneesmiddel niet indien uw arts u heeft meegedeeld dat u het suiker glucose of galactose niet verdraagt.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Kinderen

Als uw kind diarree heeft gepaard gaande met uitdroging of diarree die het gevolg is van een andere ziekte, gebruik Barexal dan niet als enige behandeling. Barexal mag dan enkel als aanvullende behandeling gebruikt worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Neem andere geneesmiddelen anderhalf uur vóór of na Barexal in.

Gebruikt u naast Barexal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Barexal mag gebruikt worden gedurende de zwangerschap en borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Barexal bevat glucose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE GEBRUIKT U BAREXAL?

Volg deze instructies nauwgezet op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

- Kinderen
 - tot 2 jaar: ½ zakje, 1 tot 2 maal per dag
 - van 2 tot 5 jaar: ½ zakje, 2 tot 3 maal per dag
 - van 5 tot 10 jaar: 1 zakje, 2 maal per dag
- Volwassenen: 3-4 zakjes per dag.

Hoe innemen?

Meng het poeder met water in een glas en roer goed. Drink onmiddellijk op.

Indien nodig kan men halfvaste voeding (pap, moes...) gebruiken in plaats van water.

Heeft u te veel van Barexal gebruikt?

Wanneer u te veel van Barexal heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Een overdosering kan leiden tot ernstige verstopping (constipatie) of een maagsteen.

Bent u vergeten Barexal te gebruiken?

Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Barexal

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook Barexal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- verstopping (constipatie)

Dit komt slechts in zeldzame gevallen voor. Verminder de dosis of stop de behandeling.

- tekort aan fosfaat (een bepaalde stof in het lichaam)

Dit is in theorie mogelijk bij behandeling met zeer hoge dosissen gedurende een lange periode.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, EUROSTATION II, Victor Hortaplein 40/ 40, 1060 Brussel. Website: www.fagg.be. e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U BAREXAL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Barexal niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Barexal?

- De werkzame stoffen in Barexal zijn dioctaëdrisch smectiet 3 g, aluminiumhydroxide en magnesiumcarbonaat gedroogde gel 0,125 g.
- De andere stoffen in Barexal zijn glucose, zoethoutextract, natriumsaccharinaat, vanilline

Hoe ziet Barexal er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Poeder voor orale suspensie.

Zakjes met 3,925 g poeder om met water te mengen voor inname langs de mond.

Dozen met 16, 30 en 60 zakjes. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
IPSEN nv, Guldensporenpark 87, 9820 Merelbeke, België

Fabrikant

Beaufour Ipsen Industrie, Rue Ethé Virton 20, 28100 Dreux, Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE135466

Afleveringswijze: Vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2014.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2014.