

**BIJSLUITER
DOGMINTH****1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Registratiehouder en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte::

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

B-1348 Louvain-la-Neuve

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

DOGMINTH

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Pyranteli embonas (= pyrantelum 7,5 mg) - Natr. alginas - Sorbitol. 70 % non cristallisabile - Silica colloidalis anhydrica - Methyl. parahydroxybenzoas - Propyl. parahydroxybenzoas - Aqua purificata ad 1 g.

4. INDICATIE(S)

Dogminth is aangewezen bij honden voor de behandeling van gastro-intestinale wormziekten zoals *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* en *Uncinaria stenocephala*.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

6. BIJWERKINGEN

Er zijn geen bijwerkingen waargenomen.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden

**8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)**

Dogminth wordt toegediend in een unieke orale dosis.

De dosering bedraagt 5 mg pyrantelbase per kg levend gewicht.

Behandelingsschema:

Het is aangeraden het wormmiddel als volgt toe te dienen

- hondenjongen: vanaf de leeftijd van 2 tot 4 weken alsook op de leeftijd van 7-8 en 12 weken
- teven: onmiddellijk vóór of na de dekking en onmiddellijk vóór het jongen
- andere honden: minstens eenmaal per jaar

Het hierboven aanbevolen behandelingsschema is een “type” posologie die enkel als indicatie wordt aangegeven.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Dogminth spuiten van 16 g:

De hoeveelheid toe te dienen pasta aanpassen aan het gewicht van het dier met behulp van de gewichtschaalverdeling die op de cilinder van de spuit afgedrukt is.

Dogminth tube van 24 g:

Door een eenvoudige druk op de tube komt de pasta vrij in de vorm van een lint; daarvan wordt 2cm pasta per kg levend gewicht toegediend (overeenkomend met een dosis van 5 mg pyrantelbase per kg levend gewicht). De toe te dienen hoeveelheid pasta wordt bepaald met behulp van de schaalverdeling die op de doos voorkomt.

De hoeveelheid pasta die nodig is voor de behandeling kan rechtstreeks op de tong van het dier aangebracht worden of mag met het voedsel vermengd worden. Er zijn geen bijzondere voedingsvoorzorgen in acht te nemen.

Dogminth kan zonder gevaar worden toegediend aan honden van elke leeftijd en wordt goed verdragen door hondenjongen, zelfs bij herhaalde toedieningen.

10. WACHTTIJD

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren buiten invloed van licht wat de spuiten betreft.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

- Er zijn geen bijzondere veiligheidsmaatregelen te nemen door de personen die het product toedienen.
- Dogminth kan in alle veiligheid worden toegediend aan drachtige en zogende teven.
- Bijkomend bij de indicaties vermeld onder rubriek 4, maar waarbij deze parasieten niet endemisch zijn in België noch in Luxemburg, moeten we noteren dat Dogminth alsook aangewezen is voor de behandeling bij honden van gastro-intestinale wormziekten zoals *Ancylostoma caninum* en *Ancylostoma braziliense*.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De gepaste voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het product in het milieu terechtkomt.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Mei 2014.

15. OVERIGE INFORMATIE

BE-V164096 (spuit van 16 g)

BE-V105506 (tube van 24 g)

Vrije aflevering.