

BIJSLUITER

DOGMINTH, pasta voor oraal gebruik bij honden

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDHouder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:**Zoetis Belgium SA**

Rue Laid Burniat, 1

B-1348 Louvain-la-Neuve

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**DOGMINTH 24 g, 7,5 mg/g** pasta voor oraal gebruik bij honden

Pyranteli embonas

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Per gram:

Werkzaam bestanddeel:

Pyranteli embonas (= pyrantelum 7,5 mg)

Hulpstoffen:

Natr. alginas - Sorbitol. 70 % non cristallisabile - Silica colloidalis anhydrica - Methyl. parahydroxybenzoas - Propyl. parahydroxybenzoas - Aqua purificata ad 1 g.

4. INDICATIE(S)Het diergeneesmiddel is aangewezen bij honden voor de behandeling van gastro-intestinale wormziekten zoals *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* en *Uncinaria stenocephala*.**5. CONTRA-INDICATIE(S)**

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Geen.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiters worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORT(EN)

Honden

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

Dogminth wordt toegediend in een unieke orale dosis.

De dosering bedraagt 5 mg pyrantelbase per kg levend gewicht.

Behandelingsschema:

Het is aangeraden het wormmiddel als volgt toe te dienen

- hondenjongen: vanaf de leeftijd van 2 tot 4 weken alsook op de leeftijd van 7-8 en 12 weken
- teven: onmiddellijk vóór of na de dekking en onmiddellijk vóór het jongen
- andere honden: minstens eenmaal per jaar

Het hierboven aanbevolen behandelingsschema is een “type” posologie die enkel als indicatie wordt aangegeven.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Door een eenvoudige druk op de tube komt de pasta vrij in de vorm van een lint; daarvan wordt 2cm pasta per kg levend gewicht toegediend (overeenkomend met een dosis van 5 mg pyrantelbase per kg levend gewicht). De toe te dienen hoeveelheid pasta wordt bepaald met behulp van de schaalverdeling die op de doos voorkomt.

De hoeveelheid pasta die nodig is voor de behandeling kan rechtstreeks op de tong van het dier aangebracht worden of mag met het voedsel vermengd worden. Er zijn geen bijzondere voedingsvoorzorgen in acht te nemen.

Het diergeneesmiddel kan zonder gevaar worden toegediend aan honden van elke leeftijd en wordt goed verdragen door hondenjongen, zelfs bij herhaalde toedieningen.

10. WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de tube na EXP

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Er zijn geen bijzondere veiligheidsmaatregelen te nemen door de personen die het diergeneesmiddel toedienen.

Dracht en lactatie

Het diergeneesmiddel kan in alle veiligheid worden toegediend aan drachtige en zogende teven.

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort

Bijkomend bij de indicaties vermeld onder rubriek 4, maar waarbij deze parasieten niet endemisch zijn in België noch in Luxemburg, moeten we noteren dat het diergeneesmiddel alsook aangewezen is voor de behandeling bij honden van gastro-intestinale wormziekten zoals *Ancylostoma caninum* en *Ancylostoma braziliense*.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Januari 2020.

15. OVERIGE INFORMATIE

Tube van 24 g

BE-V105506

Vrije aflevering.