

Lisez attentivement la notice, elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Néanmoins vous devez utiliser le spray désinfectant Hansamedic avec précaution pour obtenir les meilleurs résultats.

- Conservez cette notice. Elle pourra vous être utile.
- Consultez un pharmacien si vous avez besoin d'information ou de conseil.
- Consultez votre médecin si les symptômes empirent ou ne s'améliorent pas après 2 jours.

*Contenu de la notice*

1. *Qu'est ce que le spray désinfectant Hansamedic et pourquoi est-il utilisé?*
2. *Que devez-vous savoir avant d'utiliser le spray désinfectant Hansamedic?*
 3. *Comment utiliser le spray désinfectant Hansamedic?*
 4. *Effets indésirables possibles*
 5. *Comment doit-on conserver le spray désinfectant Hansamedic?*
 6. *Informations complémentaires*

Hansamedic Spray Désinfectant

Chlorhexidine Digluconate

- La substance active est le chlorhexidine digluconate 1%
- Les autres composants sont l'alcool isopropyl et de l'eau purifiée

Titulaire de l'enregistrement : Beiersdorf S.A. – N.V. – Boulevard Industriel 30 - 1070 Bruxelles – Belgique

Fabricant : Bode Chemie GmbH & Co - Melanchthonstrasse 27 - D – 22525 Hamburg – Allemagne

Numéro de l'enregistrement: 44 IS 6 F 11

1. Qu'est ce que le spray désinfectant Hansamedic et pourquoi est-il utilisé?

- Spray de 50 ml
- Désinfectant
- A utiliser pour la désinfection de plaies superficielles.

2. Que devez-vous savoir avant d'utiliser le spray désinfectant Hansamedic?

N'utilisez pas le spray désinfectant Hansamedic:

- en cas d'hypersensibilité à la chlorhexidine ou un des autres composants.
- en cas de peau lésée (brûlée)
- en cas d'application d'un pansement occlusif.
- la chlorhexidine ne peut pas rentrer en contact avec le canal auditif, les muqueuses, les méninges ou les tissus cérébraux
- sur des parties de peau étendues
- sur les plaies des seins des femmes allaitantes

Utilisez le spray désinfectant Hansamedic avec précaution

- Si vous souffrez d'hypersensibilité à la chlorhexidine, puisque le spray désinfectant Hansamedic peut causer une irritation de la peau.
- L'application du spray désinfectant Hansamedic dans l'oreille peut causer des troubles auditifs.
- En cas d'usage du spray désinfectant Hansamedic chez les prématurés et les nourrissons
- Tout contact avec les yeux, les oreilles et la bouche doit être évité. En cas de contact éventuel, rincer immédiatement abondamment à l'eau. Soyez prudent en cas d'anamnèse eczémateuse.
- Le produit est incompatible avec les savons ou d'autres substances anioniques.

Utilisation du spray désinfectant Hansamedic en combinaison avec la nourriture ou les boissons

Pas applicable.

Grossesse

Le produit peut être utilisé pendant la grossesse.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser des médicaments.

Allaitement

Le produit peut être utilisé pendant la période d'allaitement. Le spray désinfectant Hansamedic ne peut pas être appliqué sur les plaies des seins des femmes allaitantes.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser des médicaments.

Conduite d'un véhicule et utilisation de machines

Pas applicable.

Information importante sur certains composants du spray désinfectant Hansamedic

Pas applicable.

Utilisation de Hansamedic Spray Désinfectant en combinaison avec d'autres médicaments

Le produit est incompatible avec les savons ou d'autres substances anioniques. Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou avez utilisé dernièrement d'autres médicaments, même des médicaments sans prescription médicale.

3. Comment utiliser le spray désinfectant Hansamedic?

Suivez attentivement les instructions suivantes, sauf si votre médecin vous en donne d'autres. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Pulvérisez le produit à une dizaine de centimètres de la plaie.
Séchez les bords de la plaie et appliquez un pansement.
Exclusivement pour un usage externe sur les plaies.
Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous pouvez utiliser le spray désinfectant Hansamedic.

Que devez vous faire quand vous oubliez d'utiliser le spray désinfectant Hansamedic?

Pas applicable.

Symptômes qui peuvent survenir quand vous arrêter l'utilisation du spray désinfectant Hansamedic

Pas applicable.

Mesures en cas d'utilisation de trop fortes doses

Absorption accidentelle par voie orale.

Il est peu probable que ceci cause un effet quelconque sur l'organisme, sauf en cas d'absorption massive (la chlorhexidine s'élimine très peu hors du circuit gastro-intestinal). Il est déconseillé de faire vomir. De petites quantités de lait ou d'eau peuvent éventuellement servir à diluer une ingestion massive. L'emploi de charbon actif n'est pas recommandé vu son faible pouvoir d'absorption de la chlorhexidine. L'emploi de charbon actif est uniquement conseillé si d'autres substances ont également été absorbées. Un lavage d'estomac peut être fait, mais seulement en cas d'absorption massive et immédiatement après l'absorption. Les symptômes de surdosage d'alcool isopropyl sont analogues à ceux d'une intoxication à l'éthanol, c'est-à-dire dépression du système cérébral central, nausées, vomissements, crampes abdominales, problèmes respiratoires et coma. En cas d'usage excessif du spray désinfectant Hansamedic, contactez directement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison (070/245.245).

4. Effets indésirables possibles

Comme tous les médicaments, le spray désinfectant Hansamedic peut causer des effets secondaires.

- L'effet secondaire le plus fréquent est l'irritation de la peau, suite à une hypersensibilité à la chlorhexidine.
- Rarement des réactions allergiques comme des nausées, des vertiges, une haleine courte et une forte diminution de la pression sanguine peuvent survenir.

Si vous constatez un effet secondaire non mentionné sur cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. Comment doit-on conserver le spray désinfectant Hansamedic?

Garder le spray désinfectant Hansamedic hors de la vue et hors de portée des enfants.

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Date limite d'utilisation

N'utilisez plus le spray désinfectant Hansamedic après la date "ne pas utiliser après" ou "EXP" sur le flacon.

6. Informations complémentaires

Pour toute information concernant ce produit, vous pouvez contacter votre médecin ou pharmacien.

Si souhaité, vous pouvez également contacter le titulaire de l'enregistrement.

Délivrance libre

A. Date de la dernière mise à jour de la notice: mars 2004

B. Date de l'approbation de cette notice : juillet 2004.