

CARBOBEL
MEDGENIX Benelux n.v.

NOTICE SCIENTIFIQUE

CARBOBEL TABLETTEN

DENOMINATION
CARBOBEL

TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT ET FABRICANT
MEDGENIX Benelux n.v.
Vliegveld 21
B-8560 Wevelgem

FABRICANT
AJC Pharma
Usine de Fontaury
F-16120 Châteauneuf (Charente)

COMPOSITION
Comprimés: Carbo activatus 300 mg (charbon activé d'origine végétale) – saccharum – polyvidonum – carmellosum – magnesii stearas q.s. pro tabl. compr. una.

FORME, VOIE D'ADMINISTRATION ET CONDITIONNEMENT
Comprimés pour usage orale, emballage de 30 comprimés.

PROPRIÉTÉS

Adsorption des substances nuisibles ou indésirables dans le tractus gastro-intestinal.

Le charbon actif a, à cause de sa grande surface, une grande capacité absorbante et peut lier à sa surface un grand nombre de produits chimiques, des gaz, des médicaments, des toxines. Cette liaison est une adsorption, la rétention de matières à la surface. Il ne se posent pas de liaisons chimiques (liaisons covalentes) avec les substances retenues. Ce dernier est d'une importance pour la sécurité de carbone activé.

Carbobel ne perturbe pas le fonctionnement normal gastro-intestinal.

L'adsorption est un mécanisme d'équilibrage, c'est-à-dire que l'adsorption des matières toxiques continue jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint entre la concentration de la substance adsorbé et la substance présente dans l'environnement. Pour avoir plus de possibilités d'adsorption, on devrait ajouter de carbone activé frais. Il est donc recommandé de répéter plusieurs fois l'administration de fois de charbon actif pour diminuer la concentration de matière toxique.

Le charbon actif peut lier et éliminer les substances nocives présent dans le tractus gastro-intestinal.

Le charbon actif est d'origine végétale.

INDICATIONS

Ce médicament, à base de plantes, est utilisés dans le traitement symptomatique de la digestion difficile accompagnée de météorisme et diarrhée légère après tout une pathologie grave a été exclu.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

météorisme et diarrhée.

Adultes :

À la fois : 600 à 1.200 mg (2 à 4 comprimés ou 1 à 2 cuillères à café de granules), à prendre avec une verre d'eau

Enfants de 3 ans:

À la fois: 300 à 900 mg (1 à 3 comprimés ou 2 g à 6 g de granules), à prendre avec une verre d'eau.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans sans consultation médicale.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 3 ans.

1 cuillère à café de granules = 4 g.

Cette posologie peut être administrer 3 fois par jour. Administrer après le repas.

Dans le cas de sévère diarrhée, le patient doit boire beaucoup. L'administration de fluide parentérale et d'électrolytes peut être nécessaire.

CONTRE-INDICATIONS

Il n'y a pas de contre-indications absolues.

Toutefois, il n'est pas recommandé d'administrer Carbobel Comprimés après l'utilisation d'ipéca ou en cas d'intoxication par les cyanures, le méthanol, les acides ou de bases fortes.

Comme avec chaque produit, l'hypersensibilité peut se produire pour un des composants de la composition. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans et ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans sans avis médical.

EFFETS INDESIRABLES

Les fèces sont colorés en noir après avoir pris Carbobel Comprimés. Il est recommandé d'informer le patient.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

S' il y a aucune amélioration dans le traitement de la diarrhée ou si les symptômes réapparaissent, un médecin doit être consulté.

Chez l'empoisonnement, un médecin doit être appeler immédiatement. L'inhalation de charbon activé doit être évitée.

Ce produit contient du sucre, les diabétiques doivent être consultés. 1 comprimé contient 402,5 mg de sucre et 1 cuillère à café (= 4 g) contient 3,4 g de sucre cristallisé.

Toute diarrhée importante entraîne un risque grave de déshydratation et une perte de sels minéraux. L'administration d'eau suffisante et de sels est nécessaire.

GROSSESSE ET LACTATION

Ce produit, s'il est connu, sans objections, conformément à la suscription, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

INTERACTIONS

En raison de son effet non-sélectif, le charbon activé peut diminuer l'absorption de divers médicaments. Des précautions particulières sont donc recommandées pour l'utilisation de contraceptifs, les anticoagulants, les antibiotiques.

Il est recommandé de laisser un période de 2 à 4 heures entre l'admission de Carbobel Comprimés en et l'administration d'un autre médicament.

De très fortes doses, pris pendant de longues périodes, peut, par l'inclusion d'enzymes digestives et de vitamines, causer des difficultés digestives et des carences en vitamine.

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C, dans l'emballage original et à l'abri de l'humidité.

Ce médicament a une durée de validité limitée. Consultez la date de péremption (le premier jour du mois indiqué de l'année indiquée) imprimée sur l'emballage après le sigle « EX ».

Ne pas laisser à la portée des enfants.

DELIVRANCE

Libre.

DERNIERE MISE A JOUR DE LA NOTICE : mars 2013