

## NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**Diclofenac EG 25 mg comprimés enrobés**  
**Diclofenac EG 50 mg comprimés enrobés**  
**Diclofenac EG Retard 75 mg comprimés à libération prolongée**  
**Diclofenac EG Retard 100 mg comprimés à libération prolongée**

Diclofénac sodique

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### **Que contient cette notice?**

1. Qu'est-ce que Diclofenac EG et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Diclofenac EG
3. Comment prendre Diclofenac EG
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Diclofenac EG
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### **1. Qu'est-ce que Diclofenac EG et dans quel cas est-il utilisé?**

Diclofénac EG est destiné au traitement:

- des inflammations touchant les articulations et les tissus en dehors des articulations
- des symptômes douloureux au niveau de la colonne vertébrale
- des crises aiguës de goutte
- des douleurs, des inflammations ou des gonflements (œdèmes) après une blessure, une intervention chirurgicale ou dentaire.
- des douleurs gynécologiques et/ou des inflammations telles que des règles douloureuses.

Le traitement par Diclofenac EG est un traitement symptomatique ou un traitement d'appoint.

### **2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Diclofenac EG?**

#### **N'utilisez jamais Diclofenac EG:**

- si vous êtes allergique au diclofénac ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6). Les signes d'une réaction d'hypersensibilité incluent: gonflement du visage et de la bouche (angiooedème), troubles respiratoires, douleurs thoraciques, écoulement nasal, éruption cutanée ou toute autre réaction de type allergique.
- Diclofenac EG ne peut pas être utilisé par les patients chez lesquels la prise de médicaments dotés des mêmes indications a entraîné une crise d'asthme, de l'urticaire ou une inflammation nasale aiguë.
- si vous souffrez d'une maladie cardiaque et/ou d'une maladie vasculaire cérébrale avérée, par exemple si vous avez été victime d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral (AVC), d'un accident ischémique transitoire (AIT) ou d'une obstruction des vaisseaux sanguins irriguant le cœur ou le cerveau ou si vous avez été opéré(e) pour corriger cette obstruction (par exemple, pontage).
- si vous avez ou avez eu des problèmes de circulation sanguine (artériopathie périphérique)

- si vous présentez un ulcère, une hémorragie ou une perforation de l'estomac ou de l'intestin; ou des antécédents de troubles gastro-intestinaux tels qu'un ulcère ou des hémorragies de l'estomac après la prise de médicaments anti-inflammatoires dans le passé
- si vous souffrez d'une affection importante du foie
- si vous souffrez d'une insuffisance rénale modérée à sévère
- si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque sévère
- si vous êtes enceinte depuis plus de 6 mois

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Diclofenac EG.

Avant que votre médecin ne vous prescrive Diclofenac EG, assurez-vous qu'il sache, le cas échéant:

- que vous fumez
- que vous êtes diabétique
- que vous avez une angine de poitrine (sensation d'oppression douloureuse au niveau de la poitrine), des caillots sanguins, une pression artérielle élevée (hypertension) ou un taux élevé de cholestérol ou de triglycérides (types de graisses) dans le sang

Les effets indésirables peuvent être réduits au minimum en utilisant la plus faible dose efficace pendant la durée la plus courte nécessaire.

Les hémorragies, ulcères ou perforations gastro-intestinaux ont généralement des conséquences plus graves chez les patients âgés. Ces troubles peuvent survenir à n'importe quel moment du traitement, avec ou sans signaux d'alarme, que le patient ait ou non des antécédents. Dans les rares cas d'hémorragies ou d'ulcères gastro-intestinaux chez des patients traités par Diclofenac EG, l'utilisation de ce médicament doit être arrêtée.

Comme avec d'autres médicaments similaires, des réactions allergiques sont possibles dans de rares cas, même en l'absence de traitement antérieur par ce médicament. Les médicaments appartenant au même groupe que Diclofenac EG peuvent masquer des symptômes spécifiques de certaines maladies infectieuses, et par conséquent retarder le diagnostic et l'instauration d'un traitement adéquat.

Diclofenac EG doit être conservé hors de la portée des enfants.

Une surveillance médicale rigoureuse est requise chez les patients présentant des symptômes d'affections gastro-intestinales, ayant des antécédents d'ulcère gastrique ou intestinal, atteints d'inflammation du côlon ou de la maladie de Crohn et souffrant de troubles graves de la fonction hépatique.

Avertissez votre médecin si vous avez récemment subi ou allez subir une intervention chirurgicale de l'estomac ou du tractus intestinal avant de prendre Diclofenac EG, car Diclofenac EG peut parfois compliquer la cicatrisation de votre intestin après l'intervention.

Au cours d'un traitement par Diclofenac EG, une augmentation d'une ou plusieurs enzymes hépatiques peut être constatée. Une inflammation du foie peut survenir en l'absence de signes précurseurs. La prudence est de rigueur lors de l'administration de Diclofenac EG à des patients atteints de porphyrie hépatique, car Diclofenac EG peut provoquer une crise.

Une prudence particulière est de rigueur chez les patients présentant une atteinte de la fonction cardiaque ou rénale, chez les patients âgés, chez les patients qui prennent des diurétiques et en cas de diminution du volume d'eau corporel, quelle qu'en soit la cause (par exemple après une intervention chirurgicale lourde).

En cas de traitement de longue durée par Diclofenac EG, il est nécessaire de réaliser une analyse sanguine complète à intervalles réguliers. Une surveillance attentive s'impose chez les patients présentant des troubles de la coagulation.

Chez les patients âgés, une prudence particulière est de mise, en particulier par rapport aux effets indésirables au niveau des reins, de l'estomac et de l'intestin. Ces patients doivent prendre la plus faible dose efficace, surtout lorsqu'ils sont affaiblis ou que leur poids corporel est faible.

Les médicaments tels que Diclofenac EG peuvent être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque («infarctus du myocarde») ou d'accident vasculaire cérébral. Ne pas dépasser la dose recommandée et ne pas utiliser le médicament plus longtemps que la durée de traitement prescrite. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

### **Autres médicaments et Diclofenac EG**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Diclofenac EG peut notamment influencer l'effet des médicaments suivants:

- lithium ou inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine (ISRS) (utilisés en cas de dépression)
- digoxine (utilisée en cas d'insuffisance cardiaque)
- médicaments contre le diabète (antidiabétiques)
- médicaments destinés à augmenter la production d'urine (diurétiques)
- médicaments destinés à empêcher la coagulation sanguine (anticoagulants)
- inhibiteurs de l'ECA ou bêta-bloquants (groupe de médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque)
- autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'acide acétylsalicylique ou l'ibuprofène
- corticostéroïdes (utilisés pour réduire l'inflammation de certaines régions corporelles)
- méthotrexate (médicament contre le cancer)
- ciclosporine (immunosuppresseur, principalement utilisé dans les transplantations)
- colestyramine et colestipol (utilisés pour faire baisser le cholestérol)
- quinolones (utilisées contre les infections)
- voriconazole et fluconazole (contre les infections fongiques)
- amiodarone (contre les troubles du rythme cardiaque)
- phénytoïne (utilisée pour traiter les crises d'épilepsie)

Diclofenac EG est également susceptible de renforcer l'effet d'autres médicaments. Pour cette raison, il est conseillé de ne jamais associer Diclofenac EG à un autre médicament sans avoir demandé au préalable l'avis de votre médecin.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

En ce qui concerne l'utilisation de Diclofenac EG au cours de la grossesse, il convient de respecter les indications du médecin. Dans tous les cas, il faut éviter de prendre Diclofenac EG au cours des trois derniers mois de la grossesse, car ce médicament est susceptible de retarder le déclenchement de l'accouchement et de ralentir son déroulement. Il faut également noter l'existence d'un risque d'hémorragie lorsque des médicaments du groupe auquel appartient Diclofenac EG sont utilisés en fin de grossesse.

Diclofenac EG peut être utilisé pendant l'allaitement, car seules des quantités négligeables du médicament passent dans le lait maternel; par conséquent, aucun effet néfaste n'est à craindre pour le nourrisson.

Comme avec d'autres anti-douleurs non stéroïdiens, Diclofenac EG peut avoir un effet négatif sur la fertilité féminine; son utilisation est donc déconseillée chez les femmes qui souhaitent débuter une grossesse.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Étant donné que Diclofenac EG provoque des étourdissements, des troubles de la vue, une somnolence ou d'autres effets sur le système nerveux, il est déconseillé de conduire des véhicules et d'utiliser des machines durant le traitement par ce médicament.

### **Diclofenac EG Retard comprimés à libération prolongée contient du saccharose**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, consultez-le avant de prendre ce médicament.

## **3. Comment prendre Diclofenac EG?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Ne pas dépasser la dose recommandée. Il est important de prendre la plus faible dose possible pour lutter contre la douleur. De plus, vous ne devez pas prendre ce médicament plus longtemps que nécessaire.

*Utilisation chez les adultes et les adolescents à partir de 14 ans*

*Diclofenac EG 25 et 50 mg comprimés enrobés*

*Diclofenac EG Retard 75 et 100 mg comprimés à libération prolongée*

En règle générale, la dose d'attaque est de 100 à 150 mg par jour. Dans les cas peu sévères et en traitement d'entretien, une dose comprise entre 75 et 100 mg par jour suffit dans la plupart des cas. La dose journalière peut toutefois être augmentée jusqu'à 150 mg.

En cas d'utilisation de Diclofenac EG comprimés enrobés, la dose journalière sera généralement répartie en 2 à 3 prises.

Pour éliminer la douleur nocturne et la raideur matinale, l'administration de comprimés pendant la journée peut être complétée par celle d'un suppositoire au coucher (jusqu'à une dose maximale de 150 mg).

Les comprimés à libération prolongée de Diclofenac EG Retard permettent de réduire le nombre de prises. Selon les besoins, prendre un comprimé à libération prolongée de Diclofenac EG Retard 75 mg une ou deux fois par jour, ou un comprimé à libération prolongée de Diclofenac Retard EG 100 mg une fois par jour.

Si les symptômes sont le plus prononcés pendant la nuit ou le matin, les comprimés à libération prolongée de Diclofenac EG Retard seront de préférence pris le soir.

Pour le traitement des règles douloureuses, la dose journalière, généralement comprise entre 50 et 150 mg, doit être adaptée sur une base individuelle. Dans cette situation, la dose initiale est généralement comprise entre 50 et 100 mg par jour. Si nécessaire, cette dose peut être augmentée au cours des règles suivantes, jusqu'à une dose journalière maximale de 200 mg. Le traitement doit être instauré dès l'apparition des premiers symptômes et sera poursuivi pendant 2 à 3 jours, en fonction de la douleur.

### **Utilisation chez les enfants**

Chez l'enfant, l'utilisation du Diclofenac EG se limitera au traitement des inflammations articulaires.

Diclofenac EG peut être administré à partir de l'âge de 1 an, à une dose journalière comprise entre 0,5 mg par kg de poids corporel et 3 mg par kg de poids corporel, à répartir sur 2 à 3 prises.

Diclofenac EG 50 mg comprimés enrobés et Diclofenac EG Retard 75 mg et 100 mg comprimés à libération prolongée ne sont pas indiqués chez les enfants.

Ne pas dépasser les doses indiquées.

### **Mode d'administration**

Comprimés à prendre par la bouche; avaler les comprimés enrobés de Diclofenac EG sans les mâcher, de préférence avant les repas.

Avaler les comprimés à libération prolongée de Diclofenac EG Retard entiers avec un peu de liquide, de préférence pendant les repas.

### **Si vous avez pris plus de Diclofenac EG que vous n'auriez dû**

Si vous avez pris trop de Diclofenac EG, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

### *Symptômes*

Des doses trop élevées de Diclofenac EG ne provoquent pas de tableau clinique caractéristique.

Les symptômes suivants peuvent se manifester:

- maux de tête, agitation, crampes musculaires, irritabilité, manque de coordination motrice, étourdissements, convulsions, surtout chez les enfants en bas âge
- maux d'estomac, nausées, vomissements, vomissements de sang, diarrhée, ulcère gastro-intestinal
- troubles hépatiques
- diminution de la production d'urine

### *Traitement (instructions destinées au médecin)*

Le traitement d'une intoxication aiguë par des anti-inflammatoires non stéroïdiens consiste principalement en des mesures de soutien et symptomatiques telles que:

- prévenir la résorption, aussi précocement que possible, au moyen d'un lavage d'estomac et de l'administration de charbon actif.
- traitement de soutien et symptomatique en cas de complications telles qu'hypotension, insuffisance rénale, convulsions, irritation gastro-intestinale et dépression respiratoire.

Pour l'élimination des anti-inflammatoires non stéroïdiens, il est vraisemblablement inutile d'avoir recours à des mesures thérapeutiques spécifiques telles que l'élimination accélérée, la dialyse ou l'hémo-perfusion, cela en raison de leur haut degré de liaison aux protéines et de leur forte métabolisation.

### **Si vous oubliez d'utiliser Diclofenac EG**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **Si vous arrêtez d'utiliser Diclofenac EG**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. Quels sont les effets indésirables éventuels?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les fréquences sont définies comme suit:

- Très fréquent : peut toucher plus de 1 personne sur 10
- Fréquent : peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10
- Peu fréquent : peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100
- Rare : peut toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000
- Très rare : peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10 000
- Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles

#### *Affections gastro-intestinales*

- Fréquent: douleur d'estomac, autres troubles gastro-intestinaux (p.ex. nausées, vomissements, diarrhée, crampes abdominales, troubles digestifs, flatulence, manque d'appétit)
- Rare: gastrite, hémorragies gastro-intestinales, vomissements de sang, selles noires, ulcère d'estomac avec ou sans hémorragie ou perforation, diarrhée hémorragique
- Très rare: affections abdominales inférieures telles qu'une inflammation hémorragique et ulcéreuse du colon, inflammation du pancréas (lien de causalité inconnu), inflammation de la bouche avec présence d'aphtes, inflammation de la langue, lésions de l'œsophage, constipation, rétrécissement de l'intestin

Il faut attirer l'attention sur la possibilité d'apparition de lésions superficielles ou d'ulcérations de l'estomac; celles-ci sont parfois présentes sans autres symptômes qu'une perte de sang occulte ou des selles noires.

Certains effets indésirables peuvent être graves. Si vous remarquez les symptômes suivants, arrêtez d'utiliser Diclofenac EG et consultez immédiatement votre médecin:

- Légères crampes abdominales et sensibilité de l'abdomen, perceptibles peu après l'instauration du traitement par Diclofenac EG et suivies d'un saignement rectal ou d'une diarrhée sanglante généralement moins de 24 heures après l'apparition des douleurs abdominales (fréquence indéterminée, ne peut être estimée sur la base des données disponibles).
- douleurs thoraciques, qui peuvent être le signe d'une réaction allergique potentiellement grave appelée syndrome de Kounis

#### *Affections psychiatriques*

- Très rare: désorientation, dépression, insomnies, cauchemars, irritabilité, trouble psychotique.

#### *Affections du système nerveux*

- Fréquent: maux de tête, sensation d'ébriété, étourdissements
- Rare: somnolence
- Très rare: troubles sensoriels, y compris picotements, troubles de la mémoire, convulsions, anxiété, tremblements, altération du goût, méningite, accident vasculaire cérébral

#### *Affections oculaires*

- Très rare: troubles de la vue (diminution de la vue, vision trouble, vision double)

#### *Affections de l'oreille et du labyrinthe*

- Fréquent: étourdissements
- Très rare: troubles de l'ouïe, acouphène (bourdonnements d'oreille)

#### *Affections de la peau et du tissu sous-cutané*

- Fréquent: éruption cutanée
- Rare: urticaire
- Très rare: eczéma, éruptions avec formation de vésicules, rougeur de la peau, syndrome de Lyell (décollement de l'épiderme), syndrome de Stevens-Johnson, chute de cheveux, hypersensibilité à la lumière, hémorragies punctiformes, prurit (démangeaisons)

#### *Affections du rein et des voies urinaires*

- Rare: œdème
- Très rare: insuffisance rénale, inflammation du rein, présence de sang dans les urines, présence de protéines dans les urines, nécrose des papilles rénales

Dans la plupart des cas, les affections rénales sont une conséquence de l'utilisation chronique de Diclofenac EG. Ce sont surtout les patients âgés qui doivent se montrer particulièrement attentifs aux problèmes rénaux.

#### *Affections hépatobiliaires*

- Fréquent: élévation de certaines enzymes hépatiques
- Rare: inflammation du foie, accompagnée ou non d'ictère (jaunisse), trouble hépatique
- Très rare: hépatite aiguë, nécrose du foie, insuffisance hépatique

#### *Affections hématologiques et du système lymphatique*

- Très rare: anomalies sanguines, anémie. La signification de ces anomalies relève de la compétence de votre médecin.

#### *Affections du système immunitaire*

- Rare: réactions d'hypersensibilité telles qu'asthme et réactions allergiques généralisées, y compris des chutes de tension et un choc
- Très rare: angio-œdème (notamment œdème de la face [gonflement du visage])

#### *Affections cardiaques*

- Très rare: palpitations, douleurs dans la poitrine, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde
- Les médicaments tels que Diclofenac EG peuvent être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque («infarctus du myocarde») ou d'accident vasculaire cérébral.

#### *Affections vasculaires*

- Très rare: augmentation de la tension artérielle, inflammation des vaisseaux sanguins
- L'utilisation prolongée de Diclofenac EG peut entraîner une augmentation de la tension artérielle.

#### *Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales*

- Rare: asthme (y compris essoufflement)
- Très rare: inflammations bénignes du tissu pulmonaire (pneumopathie)

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via AFMPS – Division Vigilance – Boîte Postale 97 – B-1000 Bruxelles Madou ou via le site internet: [www.afmps.be](http://www.afmps.be). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. Comment conserver Diclofenac EG?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à température ambiante (15-25° C). A conserver dans l'emballage d'origine extérieur à l'abri de la lumière.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après «EXP».La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

### **Ce que contient Diclofenac EG**

#### Diclofenac EG 25 mg comprimés enrobés:

- La substance active est le diclofénac sodique. Chaque comprimé enrobé contient 25 mg de diclofénac sodique.
- Les autres composants sont: cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium, gélatine, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, stéarate de magnésium, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, talc, acétate phtalate de cellulose, phtalate de dibutyle, oxyde de fer jaune (E172), dioxyde de titane (E171), macrogol.

Diclofenac EG 50 mg comprimés enrobés:

- La substance active est le diclofénac sodique. Chaque comprimé enrobé contient 50 mg de diclofénac sodique.
- Les autres composants sont: cellulose microcristalline, carboxymethylcellulose de sodium, gélatine, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, stéarate de magnésium, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, talc, acétate phtalate de cellulose, phtalate de dibutyle, oxyde de fer jaune (E172), dioxyde de titane (E171), macrogol.

Diclofenac EG Retard 75 mg comprimés à libération prolongée:

- La substance active est le diclofénac sodique. Chaque comprimé à libération prolongée contient 75 mg de diclofénac sodique.
- Les autres composants sont: saccharose, silice colloïdale anhydre, alcool cétylique, stéarate de magnésium, polyvidone.

Diclofenac EG Retard 100 mg comprimés à libération prolongée:

- La substance active est le diclofénac sodique. Chaque comprimé à libération prolongée contient 100 mg de diclofénac sodique.
- Les autres composants sont: saccharose, silice colloïdale sodique, alcool cétylique, stéarate de magnésium, polyvidone, Opadry OY-L-rose, polysorbate.

**Aspect de Diclofenac EG et contenu de l’emballage extérieur**

Diclofenac EG 25 mg comprimés enrobés:

Plaquette de 10, 30, 60 et 100 comprimés

Diclofenac EG 50 mg comprimés enrobés:

Plaquettes de 10, 30 et 50 comprimés

Diclofenac EG Retard 75 mg comprimés à libération prolongée

Plaquette de 10 et 60 comprimés

Diclofenac EG Retard 100 mg comprimés à libération prolongée

Plaquettes de 10, 30 et 60 comprimés

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant**

*Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché*

EG (Eurogenerics) SA – Esplanade Heysel b22 – 1020 Bruxelles

*Fabricant*

Sanico NV – Veedijk 59 – 2300 Turnhout

**Numéros d’autorisation de mise sur le marché:**

Diclofenac EG 25 mg comprimés enrobés:	BE149703.
Diclofenac EG 50 mg comprimés enrobés:	BE149712.
Diclofenac EG Retard 75 mg comprimés à libération prolongée:	BE210831.
Diclofenac EG Retard 100mg comprimés à libération prolongée:	BE210847.

**Mode de délivrance:** sur prescription médicale.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée/révisée est 10/2019 / 09/2019.**