

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Levofloxacin EG 500 mg comprimés pelliculés

Lévofloxacine hémihydratée

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Levofloxacin EG 500 mg et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Levofloxacin EG 500 mg
3. Comment prendre Levofloxacin EG 500 mg
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Levofloxacin EG 500 mg
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Levofloxacin EG 500 mg et dans quel cas est-il utilisé

Le nom de votre médicament est Levofloxacin EG 500 mg. Levofloxacin EG 500 mg contient une substance active appelée lévofloxacine. Elle appartient à une classe de médicaments appelés antibiotiques. La lévofloxacine est un antibiotique de type « quinolone ». Elle agit en tuant les bactéries responsables d'infections dans votre organisme.

Levofloxacin EG 500 mg peut être utilisé dans le traitement des infections touchant :

- les sinus
- les poumons, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires de longue durée ou une pneumonie
- les voies urinaires, notamment au niveau de vos reins ou de votre vessie
- la prostate, en cas d'infection de longue durée
- la peau et les tissus sous-cutanés, y compris les muscles. Ces tissus sont parfois appelés « tissus mous ».

Dans certaines situations particulières, Levofloxacin EG 500 mg peut être utilisé pour réduire le risque de contracter une maladie pulmonaire appelée maladie du charbon, ou pour réduire l'aggravation de cette maladie après une exposition à la bactérie responsable de la maladie du charbon.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Levofloxacin EG 500 mg

Ne PRENEZ jamais Levofloxacin EG 500 mg

- Si vous êtes allergique à la lévofloxacine, à tout autre antibiotique de type « quinolone » tel que moxifloxacine, ciprofloxacine ou ofloxacine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Les signes d'une réaction allergique incluent: éruption cutanée, difficultés à avaler ou à respirer, gonflement des lèvres, du visage, de la gorge ou de la langue
- Si vous avez déjà souffert d'épilepsie

- Si vous avez déjà eu un problème à vos tendons, tels qu'une tendinite, qui était liée à un traitement par un antibiotique de la famille des quinolones. Le tendon est la structure par laquelle un muscle s'insère sur un os.
- Si vous êtes un enfant ou un adolescent en période de croissance
- Si vous êtes enceinte, pourriez être enceinte ou pensez pouvoir être enceinte
- Si vous allaitez.

Ne prenez jamais ce médicament si vous êtes dans l'une des situations citées plus haut. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Levofloxacin EG 500 mg.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament si:

- Vous avez 60 ans ou plus
- Vous prenez des corticostéroïdes, parfois appelés stéroïdes (voir rubrique « Autres médicaments et Levofloxacin EG 500 mg »)
- Vous avez déjà fait une crise d'épilepsie
- Vous avez eu des lésions du cerveau du fait d'un accident vasculaire cérébral, ou une autre lésion cérébrale
- Vous avez des problèmes de reins
- Vous souffrez de ce que l'on appelle un « déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase ». Vous êtes plus susceptible de présenter des problèmes sanguins graves lorsque vous prenez ce médicament.
- Vous avez déjà eu des problèmes de santé mentale
- Vous avez déjà eu des problèmes cardiaques: il faut être prudent avec ce type de médicament si vous êtes né(e) avec ou si vous avez des antécédents familiaux d'allongement de l'intervalle QT (observé à l'ECG, enregistrement électrique du cœur), si vous avez un déséquilibre électrolytique dans le sang (en particulier de faibles taux de potassium ou de magnésium dans le sang), si vous avez un rythme cardiaque très lent (appelé « bradycardie »), si vous avez un cœur affaibli (insuffisance cardiaque), si vous avez des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes une femme, ou si vous êtes âgé(e) ou si vous prenez d'autres médicaments entraînant certaines anomalies à l'ECG (voir rubrique « Autres médicaments et Levofloxacin EG 500 mg »).
- Vous êtes diabétique
- Vous avez déjà eu des problèmes de foie
- Vous êtes atteint(e) de myasthénie grave
- Si vous avez reçu un diagnostic de fuite des valves cardiaques (régurgitation des valves cardiaques)
Si vous avez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique, de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, syndrome de Turner, syndrome de Sjögren [une maladie auto-immune inflammatoire], ou des troubles vasculaires tels que l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la maladie de Behçet, l'hypertension artérielle ou une athérosclérose connue, la polyarthrite rhumatoïde [une maladie des articulations] ou l'endocardite [une infection du cœur]).

Si vous ressentez une douleur soudaine et intense au niveau de l'abdomen, la poitrine ou le dos, qui peuvent être des symptômes d'un anévrisme et d'une dissection aortiques, rendez-vous immédiatement aux urgences. Votre risque peut être augmenté si vous êtes traité avec des corticostéroïdes administrés par voie générale.

Si vous ressentez soudainement un essoufflement, en particulier lorsque vous vous allongez sur votre lit, ou si vous remarquez un gonflement de vos chevilles, de vos pieds ou de votre abdomen, ou une nouvelle apparition de palpitations cardiaques (sensation de battements de cœur rapides ou irréguliers), vous devez en informer un médecin immédiatement.

Si vous n'êtes pas sûr(e) que l'une des conditions ci-dessus s'applique à votre cas, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Levofloxacin EG 500 mg.

Autres médicaments et Levofloxacin EG 500 mg

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. En effet, Levofloxacin EG 500 mg peut influencer l'effet de certains autres médicaments. Inversement, certains médicaments peuvent influencer l'effet de Levofloxacin EG 500 mg.

En particulier, prévenez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants. En effet, le risque de développer des effets indésirables pourrait augmenter si vous prenez ces médicaments avec Levofloxacin EG 500 mg:

- Corticoïdes, parfois appelés stéroïdes, utilisés contre l'inflammation. Vous avez plus de risques de développer une inflammation et/ou une rupture des tendons.
- Warfarine, utilisée pour fluidifier le sang. Votre risque de saignement pourrait augmenter. Votre médecin effectuera éventuellement des contrôles sanguins réguliers pour vérifier la qualité de la coagulation de votre sang.
- Théophylline, utilisée dans les problèmes respiratoires. Vous avez plus de risque de faire une crise d'épilepsie si vous prenez ce médicament en association avec Levofloxacin EG 500 mg.
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'acide acétylsalicylique, l'ibuprofène, le fenbufène, le kétoprofène et l'indométhacine. Vous avez plus de risque de faire une crise d'épilepsie si vous prenez ces médicaments en association avec Levofloxacin EG 500 mg.
- Ciclosporine, utilisée après les transplantations d'organes. Vous pourriez avoir plus de risque de développer les effets indésirables de la ciclosporine.
- Médicaments connus pour influencer le battement de cœur. Il s'agit des médicaments utilisés pour les anomalies du rythme cardiaque (antiarythmiques tels que quinidine, hydroquinidine, disopyramide, sotalol, dofétilide, ibutilide et amiodarone), pour la dépression (antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline et l'imipramine), pour les troubles psychiatriques (antipsychotiques) et pour les infections bactériennes (antibiotiques de la famille des « macrolides », tels que l'érythromycine, l'azithromycine et la clarithromycine).
- Probenécide - utilisé contre la goutte - et cimétidine - utilisée dans les ulcères et les brûlures d'estomac. Une prudence particulière s'impose lorsque l'un de ces médicaments est pris en association avec Levofloxacin EG 500 mg. Votre médecin vous donnera éventuellement une dose plus faible si vous avez des problèmes de reins.

Ne prenez jamais Levofloxacin EG 500 mg en même temps que les médicaments suivants, car ceux-ci peuvent modifier le mode d'action de Levofloxacin EG 500 mg:

- comprimés à base de fer (contre l'anémie), suppléments de zinc, antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium (contre les acidités ou les brûlures d'estomac), didanosine ou sucralfate (contre les ulcères d'estomac). Voir rubrique 3 ci-dessous : « Si vous prenez déjà des comprimés à base de fer, des suppléments de zinc, des antiacides, de la didanosine ou du sucralfate ».

Tests urinaires visant à détecter les opiacés

Chez les personnes prenant Levofloxacin EG 500 mg, les tests urinaires peuvent donner des résultats « faussement positifs » lors de la détection des antalgiques forts appelés « opiacés ». Si votre médecin vous a prescrit un test urinaire, prévenez-le que vous prenez Levofloxacin EG 500 mg.

Tests de la tuberculose

Ce médicament peut produire des résultats « faussement négatifs » lors de certains tests laboratoire recherchant les bactéries responsables de la tuberculose.

Grossesse et allaitement

Ne prenez jamais ce médicament si :

- Vous êtes enceinte, pourriez être enceinte ou pensez pouvoir être enceinte.

- Vous allaitez ou avez l'intention d'allaiter.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez présenter des effets indésirables après avoir pris ce médicament, notamment des sensations d'étourdissement, de somnolence, une sensation de tête qui tourne (vertiges) ou des modifications de la vision. Certains de ces effets indésirables peuvent affecter votre capacité à vous concentrer et votre vitesse de réaction. Si cela se produit, ne conduisez pas et n'effectuez aucun travail qui nécessite un niveau d'attention élevé.

Levofloxacin EG 500 mg contient du lactose et du sodium

Ce médicament contient du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre Levofloxacin EG 500 mg.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé pelliculé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Levofloxacin EG 500 mg

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Comment prendre ce médicament

- Prenez ce médicament par voie orale (par la bouche)
- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau
- Les comprimés peuvent se prendre au cours des repas ou à chaque moment entre les repas

Protéger votre peau de la lumière solaire

Evitez la lumière solaire directe pendant que vous prenez ce médicament et pendant les 2 jours qui suivent l'arrêt du médicament. En effet, votre peau deviendra beaucoup plus sensible au soleil et peut vous donner des sensations de brûlure, de picotements ou former des ampoules sévères si vous ne prenez pas les précautions suivantes:

- Veillez à utiliser une crème solaire à indice de protection élevé
- Portez toujours un chapeau et des vêtements couvrant vos bras et vos jambes
- Evitez les bancs solaires

Si vous prenez déjà des comprimés à base de fer, des suppléments de zinc, des antiacides, de la didanosine ou du sucralfate

- Ne prenez pas ces médicaments en même temps que Levofloxacin EG 500 mg. Prenez votre dose de ces médicaments au moins 2 heures avant ou après Levofloxacin EG 500 mg.

Combien de comprimés prendre

- Votre médecin décidera du nombre de comprimés de Levofloxacin EG 500 mg que vous devez prendre.
- La dose dépendra du type d'infection dont vous souffrez et de la localisation de l'infection dans votre organisme.
- La durée de votre traitement dépendra de la gravité de votre infection.
- Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop faible ou trop fort, ne modifiez pas la dose de votre propre initiative, mais adressez-vous à votre médecin.

Adultes et personnes âgées

Infections des sinus

Deux comprimés de Levofloxacin EG 250 mg, une fois par jour
Ou, un comprimé de Levofloxacin EG 500 mg, une fois par jour

Infections pulmonaires, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires à long terme

Deux comprimés de Levofloxacin EG 250 mg, une fois par jour
Ou, un comprimé de Levofloxacin EG 500 mg, une fois par jour

Pneumonie

Deux comprimés de Levofloxacin EG 250 mg, une ou deux fois par jour
Ou, un comprimé de Levofloxacin EG 500 mg, une ou deux fois par jour

Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie

Un ou deux comprimés de Levofloxacin EG 250 mg par jour
Ou, 1/2 ou un comprimé de Levofloxacin EG 500 mg par jour

Infections de la prostate

Deux comprimés de Levofloxacin EG 250 mg, une fois par jour
Ou, un comprimé de Levofloxacin EG 500 mg, une fois par jour

Infections de la peau et des tissus sous-cutanés, y compris les muscles

Deux comprimés de Levofloxacin EG 250 mg, une ou deux fois par jour
Ou, un comprimé de Levofloxacin EG 500 mg, une ou deux fois par jour

Adultes et personnes âgées souffrant de problèmes rénaux

Votre médecin devra éventuellement vous prescrire une dose plus faible.

Enfants et adolescents

Ce médicament ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

Si vous avez pris plus de Levofloxacin EG 500 mg que vous n'auriez dû

Si, par accident, vous avez pris trop de Levofloxacin EG 500 mg, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/ 245 245). Emportez l'emballage du médicament avec vous. Cela permettra au médecin de savoir ce que vous avez pris. Les effets suivants peuvent survenir: crises d'épilepsie, sensation de confusion, étourdissements, diminution de la conscience, tremblements et problèmes cardiaques - entraînant des battements de cœur irréguliers ainsi que des nausées ou des brûlures d'estomac.

Si vous oubliez de prendre Levofloxacin EG 500 mg

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, à moins qu'il ne soit déjà quasi l'heure de prendre votre dose suivante. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Levofloxacin EG 500 mg

N'arrêtez-pas de prendre Levofloxacin EG 500 mg simplement parce que vous vous sentez mieux. Il est important de finir le traitement par comprimés que le médecin vous a prescrit. Si vous arrêtez trop tôt la prise des comprimés, l'infection peut réapparaître, votre état peut s'aggraver ou les bactéries peuvent devenir résistantes au médicament.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ces effets sont normalement légers ou modérés et disparaissent souvent en peu de temps.

Arrêtez de prendre Levofloxacin EG 500 mg et consultez un médecin ou rendez-vous immédiatement dans un hôpital si vous remarquez les effets indésirables suivants:

Très rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- Vous développez une réaction allergique. Les signes peuvent inclure: éruption cutanée, difficultés à avaler ou à respirer, gonflement des lèvres, du visage, de la gorge ou de la langue.

Arrêtez de prendre Levofloxacin EG 500 mg et consultez immédiatement un médecin si vous constatez l'un des effets indésirables graves suivants - vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical d'urgence:

Rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Diarrhée liquide pouvant contenir du sang, s'accompagnant éventuellement de crampes d'estomac et d'une température élevée. Elle peut être le signe d'un problème intestinal sévère.
- Douleur et inflammation de vos tendons ou ligaments, pouvant entraîner une rupture. Le tendon d'Achille est le plus souvent touché.

Crises d'épilepsie (convulsions).

Très rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- Brûlures, picotements, douleur ou engourdissement. Ces symptômes peuvent être les signes d'une affection appelée « neuropathie ».

Autres:

- Éruptions cutanées sévères pouvant inclure l'apparition de vésicules ou un décollement de la peau autour des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des organes génitaux.
- Perte d'appétit, jaunissement de la peau et des yeux, urines foncées, démangeaisons ou estomac sensible (abdomen). Ces signes indiquent la présence éventuelle de problèmes du foie, notamment d'une insuffisance hépatique pouvant être fatale

Si votre vue baisse ou si vous rencontrez tout autre trouble visuel durant le traitement par Levofloxacin EG 500 mg, consultez immédiatement un ophtalmologue.

Prévenez votre médecin si l'un des effets indésirables suivants s'aggrave ou persiste plus de quelques jours:

Fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

- Troubles du sommeil
- Maux de tête, sensation d'étourdissement
- Sensation de malaise (nausées, vomissements) et diarrhée
- Augmentation du niveau de certaines enzymes hépatiques dans votre sang

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

- Modifications du nombre des autres bactéries ou champignons, infections par des champignons appelés Candida, pouvant nécessiter un traitement
- Modifications du nombre de globules blancs observé dans les résultats de certains tests sanguins (leucopénie, éosinophilie)
- Sensation de stress (anxiété), confusion, nervosité, somnolence, tremblements, sensation de tête qui tourne (vertige)
- Essoufflement (dyspnée)
- Modifications du goût des aliments, perte d'appétit, dérangement d'estomac ou indigestion (dyspepsie), douleurs dans la région de l'estomac, sensation de ballonnement (flatulences) ou constipation
- Démangeaisons et éruption cutanée, démangeaisons sévères ou urticaire, transpiration excessive (hyperhidrose)
- Douleurs articulaires ou musculaires
- Les tests sanguins peuvent produire des résultats inhabituels à cause de problèmes de foie (augmentation de la bilirubine) ou de reins (augmentation de la créatinine)
- Faiblesse générale

Rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Tendance aux hématomes (bleus) et aux saignements du fait d'une diminution du nombre de plaquettes sanguines (thrombopénie)
- Faible nombre de globules blancs (neutropénie)
- Réponse immunitaire exagérée (hypersensibilité)
- Baisse du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Ceci est important pour les personnes diabétiques.
- Impressions visuelles ou auditives non réelles (hallucinations, paranoïa), modification de vos opinions et de vos pensées (réactions psychotiques) s'accompagnant d'un risque de pensées ou d'actions suicidaires
- Sensation de dépression, troubles mentaux, agitation, rêves anormaux ou cauchemars
- Sensation de picotements dans les mains et les pieds (paresthésies)
- Problèmes d'audition (bourdonnement d'oreille) ou de vision (vision trouble)
- Battements inhabituellement rapides du cœur (tachycardie) ou tension artérielle basse (hypotension)
- Faiblesse musculaire. Ceci est important chez les personnes atteintes de myasthénie grave (une maladie rare du système nerveux).
- Modifications du fonctionnement des reins et insuffisance rénale occasionnelle éventuellement due à une réaction allergique au niveau du rein, appelée néphrite interstitielle.
- Fièvre

Les autres effets indésirables incluent:

- Baisse du nombre de globules rouges (anémie), pouvant provoquer une pâleur ou une coloration jaune de la peau suite à une atteinte des globules rouges; baisse du nombre de tous les types de cellules sanguines (pancytopénie).
- Fièvre, mal de gorge et sensation générale de malaise qui persiste. Ceci peut être la conséquence d'une baisse du nombre de globules blancs (agranulocytose).
- Arrêt circulatoire (choc de type anaphylactique)
- Augmentation du taux de sucre dans le sang (hyperglycémie) ou baisse du taux de sucre dans le sang entraînant un coma (coma hypoglycémique). Ceci est important pour les personnes diabétiques.
- Modification de l'odorat, perte de l'odorat ou du goût (parosmie, anosmie, agueusie)
- Problèmes pour bouger et marcher (dyskinésie, troubles extrapyramidaux)
- Perte temporaire de connaissance ou du tonus postural (syncope)
- Perte temporaire de la vision
- Trouble ou perte de l'audition
- Rythme cardiaque anormalement rapide, rythme cardiaque irrégulier menaçant la vie, y compris arrêt cardiaque, altération du rythme cardiaque (appelée « allongement de l'intervalle QT », observée à l'ECG, l'enregistrement de l'activité électrique du cœur).
- Difficulté pour respirer ou respiration sifflante (bronchospasme)
- Réactions allergiques pulmonaires
- Pancréatite
- Inflammation du foie (hépatite)
- Sensibilité accrue de la peau au soleil et à la lumière ultraviolette (photosensibilité)
- Inflammation des vaisseaux qui transportent le sang dans le corps, suite à une réaction allergique (vascularite)
- Inflammation des tissus à l'intérieur de la bouche (stomatite)
- Rupture des muscles et destruction musculaire (rhabdomyolyse)
- Rougeur et gonflement des articulations (arthrite)
- Douleurs, notamment dans le dos, le thorax et les extrémités
- Crises de porphyrie chez les personnes souffrant déjà de porphyrie (une maladie métabolique très rare)
- Maux de tête persistants, s'accompagnant ou non d'une vision trouble (hypertension intracrânienne bénigne)

Des cas d'élargissement et d'affaiblissement de la paroi aortique ou de déchirure de la paroi aortique (anévrismes et dissections), qui peuvent se rompre et mettre en jeu le pronostic vital, ainsi que de fuite de valves cardiaques ont été signalés chez des patients recevant des fluoroquinolones. Voir également rubrique 2.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via **Belgique:** Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) – Division Vigilance – Boîte Postale 97 – B-1000 Bruxelles Madou – site internet: www.notifieruneffetindesirable.be. **Luxembourg:** Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy – E-mail: crpv@chru-nancy.fr – Tél.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 – Fax: (+33) 3 83 65 61 33 ou Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé à Luxembourg – E-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu – Tél.: (+352) 247-85592 – Fax: (+352) 247-95615. Lien pour le formulaire: <http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Levofloxacin EG 500 mg

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas Levofloxacin EG 500 mg après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conditions de conservation:

Ce médicament ne nécessite pas de conditions de conservation particulières, mais il est conseillé de le conserver dans les plaquettes et la boîte d'origine à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Levofloxacin EG 500 mg

La substance active est la lévofloxacin hémihydratée.

Un comprimé pelliculé contient 512,46 mg de lévofloxacin hémihydratée, équivalant à 500 mg de lévofloxacin.

Les autres composants sont:

Noyau du comprimé:

Cellulose microcristalline de type 102, cellulose en poudre, amidon prégélatinisé (amidon de grains), amidon de maïs, crospovidone de type A, povidone K25 et fumarate de stéaryle sodique

Pelliculage:

Lactose monohydraté, hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol 4000, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172) et oxyde de fer noir (E172).

Aspect de Levofloxacin EG 500 mg et contenu de l'emballage extérieur

Levofloxacin EG 500 mg se présente sous la forme d'un comprimé pelliculé oblong, rose, avec une barre de cassure sur chaque face. Le comprimé pelliculé peut être divisé en deux demi-doses égales.

Levofloxacin EG 500 mg est disponible en conditionnements de 2, 5, 7, 10, 20, 30 et 50 comprimés pelliculés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

EG (Eurogenerics) SA – Esplanade Heysel b22 – 1020 Bruxelles

Fabricants

STADA Arzneimittel AG - Stadastraße 2 – 18 - 61118 Bad Vilbel - Allemagne

STADA Production Ireland - Waterford Road – Clonmel - Co. Tipperary – Irlande

Centrafarm Services B.V. - Nieuw Donk 9 - Postbus 289 - 4879 AG Etten-Leur – Pays-Bas

EG (Eurogenerics) NV - Esplanade Heysel b22 - 1020 Bruxelles

Genus Pharmaceuticals Ltd. - Park View House 65 London Road – Newbury Berkshire RG14 1JN-
Royaume-Uni

Medinsa - Laboratorios Medicamentos Internacionales, S. A. - Solana, 26 - 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid) - Espagne

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:

Autriche : Flevoxasan 500 mg Filmtabletten

Belgique : Levofloxacin EG 500 mg comprimés pelliculés

Bulgarie : *Vivex* 500 mg filmcoated tablets

Italie : LEVOFLOXACINA EG 500 mg compresse rivestite con film

Luxembourg : Levofloxacin EG 500 mg, comprimés pelliculés

Pays-Bas : Levofloxacin STADA 500 mg, filmomhulde tabletten

Numéro d'autorisation de mise sur le marché: BE379863

Mode de délivrance: sur prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée/révisée est 03/2021 / 04/2021.