

Neo-Saberyl, 0,8 g/100 ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik

Chlorofeen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt Neo-Saberyl gebruikt?
2. Wanneer mag u Neo-Saberyl niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Neo-Saberyl?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Neo-Saberyl?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAARVOOR WORDT NEO-SABENYL GEBRUIKT?

Neo-Saberyl is aangewezen bij:

- Wassen van bevulde of etterende wonden of door een schimmel (mycose) geïnfecteerde huid.
- Reiniging van met korsten bedekte letsels en van bepaalde zweren (variceuze ulcera).
- Verwijdering van oorsmeerproppen en reiniging van geïnfecteerd eczeem van de gehoorgang.
- Ontsmetting van sanitair materiaal, recipiënten, linnen, lakens, luiers, vaat, tegels, muren, enzovoort.
- Ontsmetting van instrumenten.
- Wassen van handen, voorbereiding van het operatieveld en verloskundige ontsmetting (obstetrische antisepsis).

2. WANNEER MAG U NEO-SABENYL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Neo-Sabanyl niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Neo-Sabanyl?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Gebruik Neo-Sabanyl verdund in water.
- Om het beste ontsmettende (antiseptische) effect te bekomen, wordt aanbevolen Neo-Sabanyl te verdunnen in zacht water of gekookt water (15 minuten).
- Vermijd contact met ogen.
- Vermijd langdurig gebruik van Neo-Sabanyl op grote oppervlakken geïnfecteerde huid.
- Bloed en etter verminderen de activiteit van Neo-Sabanyl.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Neo-Sabanyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Ether (een vluchtige vloeistof) vermindert de activiteit van Neo-Sabanyl.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Bij zwangere vrouwen dient het gebruik van Neo-Sabanyl op grote oppervlakken en gedurende lange tijd te worden vermeden.

Borstvoeding

Bij vrouwen die borstvoeding geven, dient het gebruik van Neo-Sabanyl op grote oppervlakken en gedurende lange tijd te worden vermeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Neo-Sabanyl bevat geen hulpstoffen met gekend effect.

3. HOE GEBRUIKT U NEO-SABENYL?

Gebruik Neo-SabenyI altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiters of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neo-SabenyI dient voor gebruik in water te worden verdund.

De werking van Neo-SabenyI neemt niet af in aanwezigheid van zeep.

Uitwendig gebruik.

De gebruikelijke dosering is:

- Reiniging van wonden, met korsten bedekte letsels, bepaalde zweren (variceuze ulcera), door een schimmel (mycose) geïnficeerde huid, eczeem van de gehoorgang en verloskundige ontsmetting (obstetrische antiseptis): 2 tot 5 maatjes per liter water verdunnen.
- Wassen van de handen, voorbereiding van het operatieveld en verwijdering van oorsmeerproppen: 5 tot 10 maatjes per liter water verdunnen.
- Ontsmetting van recipiënten: 2 tot 4 maatjes per liter water verdunnen.
- Ontsmetting van lakens, linnen, luiers, vaat, tegels, muren, enzovoort: 5 tot 10 maatjes per 5 liter water verdunnen.
- Ontsmetting van instrumenten: 10 tot 20 maatjes per liter water verdunnen.

Als de chroomlaag van de instrumenten beschadigd is, dient men 20 g natriumbenzoaat per liter gebruiksklare oplossing van Neo-SabenyI toe te voegen.

Heeft u te veel van Neo-SabenyI gebruikt?

Wanneer u te veel van Neo-SabenyI heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Indien men accidenteel Neo-SabenyI inslikt, kan een vergiftiging (intoxicatie) optreden; deze kan tot uiting komen in gezichtsstoornissen (dubbelzien of diplopie), verwardheid, stuipen (convulsies), slaperigheid en ademhalingsmoeilijkheden.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts onder meer om nieraantasting te voorkomen.

Bent u vergeten Neo-SabenyI te gebruiken?

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Als u stopt met het gebruik van Neo-SabenyI

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Neo-SabenyI bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Volgende bijwerkingen zijn mogelijk:

- Irritatie van huid en slijmvliezen.
- Allergisch contacteczeem.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NEO-SABENYL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Gebruik Neo-Sabenyil niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.

Welke stoffen zitten er in Neo-Sabenyil?

- De werkzame stof in Neo-Sabenyil is chlorofeen 0,8 g/100 ml.
- De andere stoffen in Neo-Sabenyil zijn trolamine laurylsulfaat, dinatriumedetaat, lavendelolie, isopropylalcohol, gezuiverd water.

Hoe ziet Neo-Sabenyil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Fles van 200 ml en 1 l.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./ S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE048824 (200 ml en 1 l)

Afleveringswijze: Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 01/2012.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 03/2012.