

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Confosept wasserstoffsuperoxid 3%, Lösung zur Anwendung auf der Haut

Wasserstoffperoxid 30 %

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach einigen Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Confosept wasserstoffsuperoxid und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Confosept wasserstoffsuperoxid beachten?
3. Wie ist Confosept wasserstoffsuperoxid anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Confosept wasserstoffsuperoxid aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Confosept wasserstoffsuperoxid und wofür wird es angewendet?

Arzneimittelgruppe: Desinfektionsmittel (Antiseptikum)

Anwendungsgebiete: Zu verwenden als Desinfektionsmittel mit Reinigungswirkung, zum Beispiel für schmutzige, eventuell auch tiefere Verletzungen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Confosept wasserstoffsuperoxid beachten?

Confosept wasserstoffsuperoxid darf nicht angewendet werden, wenn

- Sie allergisch gegen Wasserstoffperoxid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Der Kontakt des Arzneimittels mit den Augen ist zu vermeiden.
- Die Anwendung von Wasserstoffperoxid in Körperhöhlen aus denen der freigesetzte Sauerstoff nicht entweichen kann (Fisteln, eingeschlossene Abzesse) ist gefährlich.

Im Zweifelsfall wird empfohlen, den Rat Ihres Arztes oder Apothekers einzuholen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal bevor Sie Confosept wasserstoffsuperoxid anwenden.
- Sie sollten auch den Abschnitt "Anwendung von Confosept wasserstoffsuperoxid zusammen mit anderen Arzneimitteln" lesen.
- Bestimmte Substanzen können die Wirkung des Arzneimittels verstärken oder abschwächen, oder dürfen aus anderen Gründen nicht gleichzeitig angewendet werden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker deshalb über andere Produkte, die Sie sonst noch anwenden. So sollte dieses Arzneimittel nicht mit reduzierenden Agenzien, wie organisches Material und oxydierbaren

Substanzen, oder mit Alkaliiodid, Permanganaten und anderen stark oxidierenden Agenzien kombiniert werden.

Fragen Sie bitte Ihren Arzt falls eine der obigen Warnungen auf Sie zutrifft bzw. zutroffen hat.

Kinder und Jugendliche

Es liegen keine Daten vor.

Anwendung von Confosept wasserstoffsuperoxid zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Anwendung von Confosept wasserstoffsuperoxid zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

3. Wie ist Confosept wasserstoffsuperoxid anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker nach oder dem medizinischen Fachpersonal, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Ausserliche Anwendung: Die zu desinfektierende Stelle, eventuell unter Zuhilfenahme einer sterilen Gaze, die mit der Lösung angefeuchtet ist, mit der Lösung benetzen oder die Lösung unmittelbar auf die Wunde gießen. Nach der Anwendung ist die Flasche so schnell und gut wie möglich zu verschließen.

Sollten Sie den Eindruck erhalten, dass die Wirkung von Confosept wasserstoffsuperoxid zu stark oder zu schwach ausfällt, dann informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Falls keine Besserung eintritt, sollten Sie Ihren Arzt nochmals konsultieren.

Ihr Arzt informiert Sie darüber, wie lange Sie Confosept wasserstoffsuperoxid anwenden sollten.

Anwendung bei Kindern und Jugendliche

Es liegen keine Daten vor.

Wenn Sie eine größere Menge von Confosept wasserstoffsuperoxid angewendet haben, als Sie sollten

Sollten Sie zu viel Confosept wasserstoffsuperoxid angewendet haben, dann wenden Sie sich bitte unmittelbar an Ihren Arzt, Apotheker oder an die Giftzentrale (070/245.245).

Bei versehentlicher Einnahme wird das Produkt vor der Aufnahme im Darm abgebaut. Es können hierbei große Mengen Sauerstoff freigesetzt werden (das Zehnfache des Volumens der eingenommenen Lösung).

Die Einnahme von Wasserstoffsuperoxid führt zu Irritationen des Magen-Darm-Traktes. Es können schmerzhafte Blähungen und Aufstoßen auftreten aufgrund der großen Menge an freigesetztem Sauerstoff im Magen.

Übelkeit, Erbrechen, Bluterbrechen sind zu erwartende Symptome. Schaumbildung im Mund kann die Atmung behindern, außerdem kann Schaum in die Lungen geraten.

Große Mengen führen vermutlich zu Entzündungen der Speiseröhre und des Magens. Wurden größere Mengen verschluckt, kann eine Magensonde in den Magen eingeführt werden, damit der freigesetzte Sauerstoff so entweichen kann.

Wenn Sie die Anwendung von Confosept wasserstoffsuperoxid vergessen haben

Nicht zutreffend.

Wenn Sie die Anwendung von Confosept wasserstoffsuperoxid abbrechen

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Bei der Applikation dieser Lösung kann kurzfristig ein Prickeln in der Wunde auftreten.
- Bei der Anwendung dieses Arzneimittels können Kontaktdermatitis (Entzündung der Haut), Schwellungen im Gesicht (aufgrund der unter der Haut vorhandenen Luft), weiße Flecken und ein Verblässen der Haut auftreten.
- Der Kontakt von Wasserstoffsuperoxid 3% mit den Augen verursacht ein prickelndes Gefühl, Irritationen, tränende Augen und verschwommenes Sehen.

Sollte eine dieser Nebenwirkungen ernste Ausmaße annehmen oder bei Ihnen eine Nebenwirkung auftreten, die nicht in dieser Packungsbeilage genannt wird, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz

Avenue Galilée - Galileelaan 5/03 1210 BRÜSSEL	Postfach 97 1000 BRÜSSEL Madou
--	--------------------------------------

Website: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Confosept wasserstoffsuperoxid aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Packungsbeilage

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen, auf Zimmertemperatur (15°C – 25°C). Die Flasche gut verschließen nach Gebrauch. Das Behältnis fest verschlossen halten.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach "EXP" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Confosept wasserstoffsuperoxid enthält

- Der Wirkstoff ist Wasserstoffperoxid 30 % (0.1g/g).
- Die sonstigen Bestandteile sind Salicylsäure, Natriumpyrophosphat-Decahydrat, konzentrierte Phosphorsäure und gereinigtes Wasser q.s. ad 1 g.

Wie Confosept wasserstoffsuperoxid aussieht und Inhalt der Packung

Darreichungsform: Lösung für die äußere Anwendung. Sterile Lösung.

Packungsgröße: Flasche von 120 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Conforma NV
Zenderstraat 10
9070 Destelbergen
Belgien
Tel: +32 (0)9 228 20 00
Fax: +32 (09) 228 22 62
E-Mail: info@conforma.be

Zulassungsnummer(n): BE161786

Abgabeform: freie Abgabe

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 12/2021