

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

NORIT 250 mg comprimés

NORIT 200 mg gélules

Charbon activé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 de jours.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Norit et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Norit ?
3. Comment utiliser Norit ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Norit ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Norit et dans quel cas est-il utilisé?

Norit contient du charbon activé. Celui-ci liera les produits nocifs dans le tube digestif et les éliminera de cette manière.

Norit est utilisé comme thérapeutique d'appoint dans le traitement d'intoxications et des symptômes de la diarrhée. Parfois Norit est administré sous forme d'un lavage gastrique. Ceci se passe généralement en clinique.

Norit se présente sous forme de comprimés et de gélules.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Norit ?

Ne prenez jamais Norit

- si vous êtes **allergique** (hypersensible) au charbon activé ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- ne pas employer lors d'intoxications (provoquées) par **des acides forts, bases fortes** ou des dérivés **du pétrole**;
- juste avant une **inspection interne de l'œsophage ou de l'estomac** (endoscopie).

Avertissement et précautions

- Si vous prenez déjà d'autres médicaments y compris les contraceptifs oraux, veuillez lire également la rubrique "Prise d'autres médicaments".

- A très haute dose, Norit peut fixer des enzymes digestifs et des vitamines quand il est donné à de très fortes doses. Ceci peut parfois provoquer **des troubles digestifs** et une **carence en vitamines**.

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Norit.

Autres médicaments et Norit

Dans les intestins Norit peut se fixer à toute une série de produits. En conséquence des médicaments peuvent, eux aussi, être fixés et évacués avec la défécation. De cette façon, le médicament peut être résorbé insuffisamment et l'action de ce médicament peut diminuer.

- Les produits suivants peuvent être fixés par Norit : **certaines antibiotiques, les anticoagulants, les médicaments vomitifs**.
- L'activité des contraceptifs oraux ("**la pilule**") peut être perturbée par l'usage simultané du charbon activé. C'est pour cela qu'on doit utiliser, au cours du traitement avec Norit, un autre moyen anticonceptionnel fiable.
- **Aspirine** (un antidouleur et un anticoagulant) et **furosémide** (un diurétique) peuvent également se lier au Norit. L'adaptation du dosage peut être nécessaire.
- **Phénytoïne** et **carbamazépine** (les deux utilisés en cas d'épilepsie) se lient aussi au Norit. En cas de thérapie concomitante la concentration de ces médicaments dans le sang doit être contrôlée. Une adaptation du dosage peut être nécessaire.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Norit avec des aliments et boissons

A très haute dose, Norit peut fixer des enzymes digestifs et des vitamines. Cela peut parfois provoquer des troubles digestifs et une carence en vitamines.

Grossesse et allaitement

Norit peut, d'après les données dont on dispose, être utilisé sans inconvénient pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Sans objet.

Norit contient du lactose, du sucrose et du sodium.

Norit 250 mg comprimés contient des sucres **le sucrose** et **le lactose**. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Norit 250 mg comprimés contient du sodium. Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Norit ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien ou en cas de doute.

S'il n'apparaît pas d'amélioration après 7 jours contactez votre médecin.

Prenez Norit (les comprimés ainsi que les gélules) toujours par la bouche avec un peu d'eau.

	Les comprimés (250 mg)	Les gélules (200 mg)	Remarques
Diarrhée	3 à 5 comprimés en une fois. Répéter jusqu'à 3 fois par jour.	3 à 4 gélules en une fois. Répéter jusqu'à 3 fois par jour (ou plus si nécessaire).	Arrêtez le traitement si la diarrhée est terminée. En cas de diarrhée aiguë l'équilibre hydroélectrique doit être rétabli. Ceci peut être fait par le médecin qui vous injectera des sels minéraux.
Les intoxications	Prenez immédiatement 10 comprimés. Répéter quelques fois à intervalles courts.	Prenez immédiatement 10 à 20 gélules. Répéter quelques fois à intervalles courts.	Cette dose est une dose indicative. Suivez toujours scrupuleusement les indications du médecin. Après la prise, le médecin peut éventuellement procéder à un rinçage gastrique ou mélanger le Norit avec de l'eau et l'administrer par sonde gastrique.

Si vous avez pris plus de Norit que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop de Norit, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Norit

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Norit

Ne pas applicable.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Au sein de chaque fréquence de groupe, les effets indésirables doivent être présentés suivant un ordre décroissant de gravité : très fréquent ($\geq 1/10$); fréquent ($\geq 1/100$, $< 1/10$); peu fréquent ($\geq 1/1000$, $< 1/100$); rare ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$); très rare ($< 1/10000$), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Très fréquent : des selles noires. Ceci ne présente aucun effet nocif.

Fréquent : vomissement et constipation.

Peu fréquent : obstruction de l'estomac.

Très rare : appendicite aiguë. Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Declaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 Bruxelles, Site internet:

www.notifieruneffetindesirable.be, e-mail: adr@afmps.be.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Norit ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25°C), dans l'emballage original.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte, l'étiquette ou la plaquette thermoformée après "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que les comprimés ou gélules ont changés de couleur.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Norit ?

- La substance active des comprimés Norit 250 mg et des gélules Norit 200 mg est le charbon activé.
- Les autres composants sont :
 - Norit 250 mg comprimés : sucrose, lactose, carboxyméthylcellulose de sodium et stéarate de magnésium.
 - Norit 200 mg gélules : gélatine, oxyde de titane et oxyde de fer.

Aspect de Norit et contenu de l'emballage extérieur

Norit 250 mg comprimés : emballage de 75 comprimés dans un pilulier en polypropylène.

Norit 200 mg gélules : emballage de 30 gélules sous plaquette thermoformée.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

KELA Pharma nv/sa
Sint Lenaartseweg 48
B-2320 HOOGSTRATEN

Fabricant

Cabot Norit Nederland B.V.
Mr. Ovingkanaal O.Z.3
NL-9871 EV KLAZIENAVEEN

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

Norit 250 mg comprimés : BE084883.

Norit 200 mg gélules : BE123837.

Conditions de prescription et de délivrance

notice

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est MM/AAAA.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 08/2021.