

NOTICE

DOGMINTH, pâte orale pour chiens

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENTTitulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots**Zoetis Belgium SA**

Rue Laid Burniat, 1

B-1348 Louvain-la-Neuve

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**DOGMINTH 24g**, 7,5 mg/g pâte orale pour chiens

Pyranteli embonas

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Par gramme :

Substance active :

Pyranteli embonas (= pyrantelum 7,5 mg)

Excipients :

Natr. alginas - Sorbitol. 70 % non cristallisable - Silica colloidalis anhydrica - Methyl. parahydroxybenzoas - Propyl. parahydroxybenzoas - Aqua purificata ad 1 g.

4. INDICATION(S)Le médicament vétérinaire est destiné au traitement des verminoses gastro-intestinales du chien causées par des nématodes tels que *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* et *Uncinaria stenocephala*.**5. CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Aucun.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Le Dogminth s'administre en prise unique par voie orale.

La posologie est de 5 mg de pyrantel base par kg de poids vif.

Le schéma de traitement

Il est conseillé de vermifuger

- les chiots: dès l'âge de 2 à 4 semaines ainsi qu'à 7-8 et 12 semaines
- les chiennes: immédiatement avant ou après la saillie et immédiatement avant la mise-bas.
- les autres chiens: minimum une fois par an.

Le schéma de traitement proposé ci-dessus présente une posologie « type » uniquement fournie à titre indicatif.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Par simple pression sur le tube, la pâte s'étale en ruban; administrer 2 cm de ruban de pâte par kg de poids vif (correspondant à une dose de 5 mg de pyrantel base par kg de poids vif). Déterminer la quantité de pâte à administrer à l'aide de l'échelle graduée située sur la boîte.

La quantité de pâte nécessaire au traitement peut être déposée directement sur la langue de l'animal ou peut être mélangée à la nourriture.

Aucune précaution alimentaire préalable n'est à observer.

Le médicament vétérinaire peut être administré sans danger aux chiens de tout âge et est bien toléré par les jeunes chiots, même lors d'administrations répétées.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

Ne pas utiliser ce médicaments vétérinaire après la date de péremption figurant sur le tube après EXP.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux

Il n'y a pas de mesures de sécurité particulière à prendre par les personnes administrant le produit

Gestation et lactation

Le médicament vétérinaire peut être administré en toute sécurité aux chiennes gestantes ou allaitantes.

Précautions particulières pour chaque espèce cible

En plus des indications fournies en rubrique 4, et bien que ces parasites ne soient pas endémiques en Belgique ni au Luxembourg, il est à noter que le médicament vétérinaire se montre également efficace dans le traitement des verminoses gastro-intestinales du chien causées par les nématodes *Ancylostoma caninum* et *Ancylostoma braziliense*.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

Janvier 2020

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Tube de 24 g
BE-V105506
Délivrance libre.