

NOTICE**Vitofyllin 50 mg**
Comprimés pelliculés pour chiens**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

WDT – Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Siemenstrasse 14
30827 Garbsen
Germany

Fabricant responsable de la libération des lots:

Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstraße 1, D – 29439 Lüchow
Allemagne

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Vitofyllin 50 mg, comprimés pelliculés pour chiens.
(Propentofylline)

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE INGRÉDIENT(S)**Principe actif:**

Chaque comprimé contient 50 mg de propentofylline.

Excipients:

Oxyde de fer, jaune, (E 172)	0,075 mg/comprimé
Dioxyde de titane, (E171)	0,215 mg/ comprimé

Comprimés pelliculés.

Comprimés jaunes, ronds, convexes, avec une barre de sécabilité en forme de croix sur une face et portant l'inscription « 50 » sur l'autre.

Le comprimé est sécable en deux ou en quatre parties égales.

4. INDICATION(S)

Amélioration de la circulation vasculaire périphérique et cérébrale. Amélioration en cas d'apathie, de léthargie et du comportement général chez le chien.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez des chiennes gestantes, en lactation ou chez les animaux reproducteurs.

Ne pas utiliser chez les chiens de moins de 2,5 kg.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif et/ou à d'autres composants du produit.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de rares (plus de 1, mais moins de 10 animaux en 10 000 animaux traités), cas, des réactions allergiques cutanées, des vomissements ou des troubles cardiaques ont été signalés. Dans ces cas, le traitement doit alors être interrompu.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S):

Chiens.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

La posologie recommandée est de 6 – 10 mg de propentofylline par kg de poids vif par jour, divisée en 2 doses de 3 - 5 mg/kg comme suit :

Afin d'assurer une posologie correcte, le poids vif de l'animal doit être déterminé avant le traitement.

Poids (kg)	Nombre de comprimé(s)		Nombre total de comprimés par jour	Dose totale journalière (mg/kg)
	matin	soir		
2,5 – 4 kg	¼	¼	½	6,3 – 10
5 – 7 kg	½	½	1	7,1 – 10
8 – 9 kg	¾	¾	1 ½	8,3 – 9,4
10 – 15 kg	1	1	2	6,7 – 10
16 – 25 kg	1½	1½	3	6 – 9,4
26 – 33 kg	2	2	4	6,1 – 7,7

Les chiens de plus de 20 kg peuvent être traités avec Vitofyllin 100 mg comprimés pelliculés pour chiens.

Les comprimés peuvent être administrés directement sur le fond de la langue du chien ou mélangés à une boulette de nourriture. L'administration se fera au moins une demi-heure avant le repas.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

10. TEMPS D'ATTENTE

Non-applicable

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver dans l'emballage d'origine (blister).. Conserver le blister dans sa boîte en carton. A conserver dans un endroit sec.

Tout comprimé divisé non utilisé doit être remis dans le blister Durée de conservation des parties divisées: 72 heures.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption mentionnée sur la boîte en carton et la plaquette thermoformée après « EXP ».

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'utilisation chez les animaux :

Les maladies spécifiques (p.ex. des maladies rénales) doivent être traitées de façon adaptée.

Une réduction du dosage doit être envisagée lorsque le chien est déjà traité pour une insuffisance cardiaque congestive ou pour une affection bronchique.

En cas d'insuffisance rénale, la dose doit être diminuée.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Eviter l'ingestion accidentelle du produit. En cas d'ingestion accidentelle des comprimés, consulter immédiatement un médecin et montrer la notice.

Se laver les mains après manipulation du produit.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Hyperexcitabilité, tachycardie, hypotension, congestion des muqueuses et vomissements. Ces symptômes disparaissent spontanément après arrêt du traitement.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères. Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

Septembre 2020

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES:

La propentofylline améliore l'irrigation sanguine : surtout celle du myocarde et des muscles.

Elle augmente également le flux sanguin ainsi que l'apport d'oxygène au niveau du cerveau, sans pour cela y augmenter le besoin en glucose. La propentofylline possède un effet chronotrope positif modéré et un effet inotrope positif marqué.

La propentofylline a également des effets antiarrhythmiques chez les chiens présentant une ischémie du myocarde ainsi qu'une activité bronchodilatatrice équivalente à celle de l'aminofylline.

La propentofylline améliore la déformabilité des érythrocytes et inhibe l'agrégation plaquettaire. Par son effet direct sur le cœur et sur la résistance périphérique des vaisseaux qu'elle réduit, la propentofylline diminue la charge cardiaque.

La propentofylline peut améliorer l'empressement à l'exercice et la tolérance à l'exercice, particulièrement chez le chien âgé.

Plaquette thermoformée en chlorure de polyvinyle/chlorure de polyvinylidène/aluminium de 14 comprimés dans une boîte en carton contenant 4 plaquettes thermoformées (56 comprimés).

Plaquette thermoformée en chlorure de polyvinyle/chlorure de polyvinylidène/aluminium de 14 comprimés dans une boîte en carton contenant 104 plaquettes thermoformées (140 comprimés).

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

BE-V418537

Mode de délivrance: A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire

Distributeur: Emdoka bv, John Lijzenstraat 16, B-2321, Hoogstraten