

**MEDICA KEELTABLETTEN HONING, 5 mg/1 mg, zuigtabletten**  
**Chloorhexidine hydrochloride - Lidocaïne hydrochloride**

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 à 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Wat is Medica keeltabletten honing en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Medica keeltabletten honing niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

**1. WAT IS MEDICA KEELTABLETTEN HONING EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

Medica keeltabletten honing is een zuigtablet voor plaatselijke werking in mond en keelholte.

Het is een ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel.

Medica keeltabletten honing is aangewezen bij:

- Behandeling van de symptomen van keelpijn, rode keel, aandoeningen van de keelholte gepaard gaande met irritatie;
- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling nodig;
- Medica keeltabletten honing bevat geen suiker en is dus ook geschikt voor suikerzieken.

**2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

**Wanneer mag u Medica keeltabletten honing niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Medica keeltabletten honing?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Medica keeltabletten honing gebruikt.

- Medica keeltabletten honing mag niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt worden. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.
- Als een te hoge dosis (meer dan 20 tabletten per dag) wordt gebruikt, is er een klein risico op vermindering van de controle op de slikreflex.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

**Kinderen**

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Medica keeltabletten honing nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

- Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen voor lichte vormen van Alzheimer (cholinesteraseremmers).
- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

**Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

**Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u bovengenoemde voorzorgen respecteert, mag u Medica keeltabletten honing gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding. Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van dit geneesmiddel.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

**Medica keeltabletten honing bevat sorbitol en sulfieten**

Medica keeltabletten honing bevat 1207 mg sorbitol, overeenkomend met 0,97 mg/mg tablet.

Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u (of uw kind) bepaalde suikers niet verdraagt of als bij u erfelijke fructose-intolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een persoon fructose niet kan afbreken), neem dan contact op met uw arts voordat u (of uw kind) dit geneesmiddel gebruikt. Sorbitol kan maag-darmklachten veroorzaken en een licht laxerende werking hebben.

Medica keeltabletten honing bevat sulfieten. Dit kan in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en ademhalingsproblemen (bronchospasme) veroorzaken.

### 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik Medica keeltabletten honing altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

*Volwassenen:* 6 tot 10 tabletten per dag.

#### **Gebruik bij kinderen**

*Kinderen vanaf 6 jaar:* 3 tot 5 tabletten per dag.

De tablet langzaam in de mond opzuigen.

Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 à 4 dagen.

#### **Heeft u te veel van Medica keeltabletten honing gebruikt?**

Wanneer u te veel van Medica keeltabletten honing heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Dit geneesmiddel bevat slechts een fractie van de toxische dosis. Bij goed gebruik zijn de risico's op overdosering zeer klein.

Symptomen van overdosering zijn: rusteloosheid, oorsuizingen, ademhalingsmoeilijkheden, verstoring van het hartritme, vermindering van de controle op de slikreflex.

#### **Bent u vergeten Medica keeltabletten honing te gebruiken?**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

#### **Als u stopt met het gebruik van Medica keeltabletten honing**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Medica keeltabletten honing bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Zeer zelden: allergische huid- en slijmvliesreacties.
- Er kunnen smaakstoornissen, een branderig gevoel aan de tong en ernstige allergische reacties (anafylactische reacties) optreden.
- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden. Deze verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten  
Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/ 40

B-1060 Brussel

Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be)

e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik Medica keeltabletten honing niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/de blisterverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

## 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.

### Welke stoffen zitten er in Medica keeltabletten honing?

- De werkzame stoffen in Medica keeltabletten honing zijn: chloorhexidine hydrochloride 5 mg - lidocaïne hydrochloride 1 mg.
- De andere stoffen in Medica keeltabletten honing zijn: sorbitol - magnesiumstearaat - watervrij citroenzuur - stevia - honing aroma.

### Hoe ziet Medica keeltabletten honing eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Medica keeltabletten honing is verkrijgbaar in een doos met 40 zuigtabletten in blisterverpakking, in een doos met 12, 36 of 48 zuigtabletten in geperforeerde eenheidsblisterverpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE464791

### Afleveringswijze

Vrije aflevering.

**Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in**

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2019.**