

NOTICE POUR LE PUBLIC

DENOMINATION ET GROUPE

VASELINE BORIQUEE STEROP 10 %
Désinfectant (léger) de la peau.

INDIQUE DANS

Désinfection : - des brûlures légères, engelures, crevasses
 - des lésions superficielles et légères de la peau

COMMENT L'UTILISER ET EN QUELLE QUANTITE ?

1 application par jour.
Après lavage à l'eau bouillie tiède, sécher la peau en tamponnant légèrement et appliquer la vaseline boriquée. Recouvrir d'un pansement.

CAS OU L'USAGE DU MEDICAMENT DOIT ETRE EVITE

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans.

EFFETS NON DESIRES

Ramollissement de la peau au niveau des lésions.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Ne pas utiliser sur des surfaces étendues de peau abîmée ou arrachée.
- Eviter le contact avec les yeux ou les muqueuses.

UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Ne pas utiliser pendant l'allaitement.

MESURES EN CAS D'UTILISATION DE TROP FORTES DOSES

- Une intoxication peut survenir suite à l'absorption accidentelle de la vaseline boriquée. Prévenez votre médecin qui prendra les mesures nécessaires.
- Une intoxication peut survenir à la suite d'une application trop prolongée entraînant une résorption.

- L'intoxication peut se manifester par des vomissements et de la diarrhée, des rougeurs sur la peau, des convulsions.

FORME, VOIE D'ADMINISTRATION ET CONDITIONNEMENT

Vaseline pour application locale. Tube de 20 g.

CONSERVATION

Température ≤ 25° C

STABILITE

Voir date d'échéance imprimée sur l'emballage.
(EXP: mois – année = date limite d'utilisation. La date de péremption est le dernier jour du mois précisé).

COMPOSITION

Acid. Boric. 100 mg – Vaseline. q.s. ad 1 g

FABRICANT

LABORATOIRES STEROP S.A.- Avenue de Scheut 46-50 - 1070 Bruxelles - Belgique.

TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT ET DISTRIBUTEUR

LABORATOIRES STEROP S.A.- Avenue de Scheut 46-50 - 1070 Bruxelles - Belgique.

Date d'approbation: 04/2015