

Bijsluiter

BIJSLUITER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata, oplossing voor cutaan gebruik

Aluminium acetotartraat (in situ bereiding uit aluminium sulfaat 10%)

Synoniem: Burowoplossing

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter :

1. Wat is Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3. Hoe gebruikt u dit middel ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel ?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS SOLUTIO ALUMINII ACETO-TARTRATIS CONFORMATA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep: Preparaat voor behandeling van geïnfecteerde huidaandoeningen.

Aluminiumzouten hebben een zwak antiseptische werking en oefenen een adstringerende werking uit op de huid en de mucosa.

Therapeutische indicaties: Te gebruiken bij geïnfecteerde huidaandoeningen o.a. furunculosis decubitus en in behandeling van eczeem van het binnenoer.

Geprefabriceerd geneesmiddel bestemd om door de officina-apotheker gebruikt te worden voor de bereiding van magistrale en officinale bereidingen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN ?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Gebruik dit geneesmiddel niet als oordruppel bij een geperforeerd trommelvlies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen" te lezen.

Bijsluiter

Raadpleeg uw arts indien de bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma kan een aanhoudend tintelend en brandend gevoel veroorzaken.

Geen afsluitend verband gebruiken aangezien dit verdamping van de vloeistof verhindert, hierdoor kan er verweking van de huid optreden en kan de groei van bacteriën op de huid worden bevorderd.

Aluminiumacetotartraat is onverenigbaar met alkaliën, alkalicarbonaten, oplosbare fosfaten, oplosbare calcium- en loodzouten, looizuur, eiwitten, gelatine, zetmeel.

Kinderen

Geen specifieke informatie

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Niet van toepassing

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma tijdens de zwangerschap en borstvoeding is afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL ?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Uitwendig gebruik

- onder de vorm van natte verbanden: voor gebruik verdunnen in verhouding 1/10 met vers gekookt en weer bekoeld water.
De verbanden op de te behandelen plaats leggen en deze regelmatig (om de 1 à 2 uur) bevochtigen met de 1/10^{de} verdunde oplossing. Geen afsluitend verband gebruiken omdat deze verdamping van de vloeistof tegengaat. Hierdoor bestaat de kans op maceratie (verweking) van de huid en bevordering van groei van bacteriële flora.
Zo mogelijk moet men ook de behandeling 's nachts voortzetten.
Bij acute huidaandoeningen zal men de natte verbanden in het algemeen niet langer dan 2-4 dagen aanbrengen (in verband met maceratie van de huid).

Bijsluiter

- Als adstringerende lotion bv. in geval van decubitus: 1/20 verdunning van de oplossing.
- Behandeling van eczeem van het binnenoor: een wattenprop bevochtigen met de oplossing en gedurende 24 uur in de gehoorgang laten.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat eventueel chronische aandoeningen een lange behandelingsduur vragen.

U mag het product niet langer dan 4 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geen specifieke informatie

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u teveel van Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Inname van aluminiumzouten uit zich door hun irriterende en mogelijks corrosieve werking en kan nausea, braken, en constipatie veroorzaken.

Behandeling van overdosering:

- Drinken van grote hoeveelheden water
- Maagspoeling wanneer patiënt niet gebraakt heeft
- Shock opvangen indien patiënt tekenen van collaps vertoont.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Niet van toepassing.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Hoge doses aluminium kunnen irriterend en corrosief werken.
- Bij het te lang opleggen van de natte verbanden kan verweking van de huid ontstaan en wordt de groei van bacteriële flora bevorderd.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein 40/ 40
B-1060 Brussel
www.fagg.be

Bijsluiter

patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht, bij kamertemperatuur (15 – 25°C).

De fles zorgvuldig gesloten houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is Aluminium acetotartraat
- De andere stoffen in dit middel zijn verdund azijnzuur, calciumcarbonaat, gezuiverd water, wijnsteenzuur

Hoe ziet Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Farmaceutische vorm: oplossing voor cutaan gebruik

Verpakkingsgrootte: fles van 1L

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant

NV Conforma

Zenderstraat 10

9070 Destelbergen

België

Tel +32 9 228 20 00

Fax +32 9 228 22 62

Email: info@conforma.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen : BE190845

Afleveringswijze: vrije aflevering

Dit product is bedoeld voor gebruik door de officina-apotheker voor de magistrale en officinale bereidingen en wordt niet als dusdanig aan het publiek verkocht.

Bijsluiter

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2014
De laatste datum waarop deze bijsluiter herzien werd augustus 2017

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Niet van toepassing