

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma, oplossing voor cutaan gebruik

Aluminium acetotartraat (in situ bereiding uit aluminium sulfaat 10%)

Synoniem: Burowoplossing

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht na een aantal dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt ?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Geneesmiddelen groep: Preparaat voor behandeling van geïnfecteerde huidaandoeningen.

Aluminiumzouten hebben een zwak antiseptische werking en oefenen een adstringerende werking uit op de huid en de mucosa.

Therapeutische indicaties: Te gebruiken bij geïnfecteerde huidaandoeningen o.a. furunculosis decubitus en in behandeling van eczeem van het binnenoer.

Geprefabriceerd medicijn bestemd om door de officina-apotheker gebruikt te worden voor de bereiding van magistrale en officinale bereidingen.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- Gebruik dit medicijn niet als oordruppels bij een geperforeerd trommelvlies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit medicijn gebruikt.
- Als u nog andere medicijnen neemt gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere medicijnen?" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien de bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Bijsluiter

Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata kan een aanhoudend tintelend en brandend gevoel veroorzaken.

Geen afsluitend verband gebruiken aangezien dit verdamping van de vloeistof verhindert, hierdoor kan er verweking van de huid optreden en kan de groei van bacteriën op de huid worden bevorderd.

Aluminiumacetotartraat is onverenigbaar met alkaliën, alkalicarbonaten, oplosbare fosfaten, oplosbare calcium- en loodzouten, looizuur, eiwitten, gelatine, zetmeel.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geen specifieke informatie.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Het gebruik van Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata tijdens de zwangerschap en borstvoeding is afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

1. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

De geadviseerde dosering is:

Uitwendig gebruik:

- Onder de vorm van natte verbanden: voor gebruik verdunnen in verhouding 1/10 met vers gekookt en weer bekoeld water. De verbanden op de te behandelen plaats leggen en deze regelmatig (om de 1 à 2 uur) bevochtigen met de 1/10^{de} verdunde oplossing. Geen afsluitend verband gebruiken omdat deze verdamping van de vloeistof tegengaat. Hierdoor bestaat de kans op maceratie (verweking) van de huid en bevordering van groei van bacteriële flora. Zo mogelijk moet men ook de behandeling 's nachts voortzetten. Bij acute huidaandoeningen zal men de natte verbanden in het algemeen niet langer dan 2-4 dagen aanbrengen (in verband met maceratie van de huid).
- Als adstringerende lotion bv. in geval van decubitus: 1/20 verdunning van de oplossing.
- Behandeling van eczeem van het binnenoor: een wattenprop bevochtigen met de oplossing en gedurende 24 uur in de gehoorgang laten.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat eventueel chronische aandoeningen een lange behandelingsduur vragen.

U mag het product niet langer dan 4 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Bijsluiter

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geen specifieke informatie.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Wanneer u teveel van Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformia heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Inname van aluminiumzouten uit zich door hun irriterende en mogelijks corrosieve werking en kan nausea, braken, en constipatie veroorzaken.

Behandeling van overdosering:

- Drinken van grote hoeveelheden water
- Maagspoeling wanneer patiënt niet gebraakt heeft
- Shock opvangen indien patiënt tekenen van collaps vertoont.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

2. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

- Hoge doses aluminium kunnen irriterend en corrosief werken.
- Bij het te lang opleggen van de natte verbanden kan verweking van de huid ontstaan en wordt de groei van bacteriële flora bevorderd.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

Galileelaan 5/03 1210 BRUSSEL	Postbus 97 1000 BRUSSEL Madou
----------------------------------	-------------------------------------

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bijsluiter

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht, bij kamertemperatuur (15°C - 25°C). De fles zorgvuldig gesloten houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is aluminium acetotartraat.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn verdund azijnzuur, calciumcarbonaat, gezuiverd water en wijnsteenzuur.

Hoe ziet Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma eruit en wat zit er in een verpakking?

Farmaceutische vorm: oplossing voor cutaan gebruik

Verpakkingsgrootte: glazen fles van 1 liter

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant

Conforma NV
Zenderstraat 10
9070 Destelbergen
België
Tel: +32 (0)9 228 20 00
Fax: +32 (09) 228 22 62
e-mail: info@conforma.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE190845

Afleveringswijze: vrije aflevering

Dit medicijn is bedoeld voor gebruik door de officina-apotheker voor de magistrale en officinale bereidingen en wordt niet als dusdanig aan het publiek verkocht.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit medicijn contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2021