

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt

Trulicity 0,75 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen Trulicity 1,5 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen Trulicity 3 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen Trulicity 4,5 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen dulaglutide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Trulicity en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Trulicity en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Trulicity bevat een actieve stof die dulaglutide wordt genoemd en wordt gebruikt om de bloedsuiker (glucose) te verlagen bij volwassenen met diabetes mellitus type 2 en kan helpen om hartziekte te voorkomen.

Diabetes type 2 is een aandoening waarbij uw lichaam niet genoeg insuline maakt, en de insuline die uw lichaam wel maakt niet zo goed werkt als zou moeten. Als dat gebeurt, hoopt de suiker (glucose) zich in het bloed op.

Trulicity wordt gebruikt:

- zonder andere geneesmiddelen als uw bloedsuiker met dieet en lichaamsbeweging alleen niet goed onder controle komt, en u geen metformine (een ander diabetes geneesmiddel) kunt gebruiken.
- of samen met andere diabetes geneesmiddelen als deze niet genoeg zijn om uw bloedsuiker onder controle te houden. Deze andere geneesmiddelen kunnen middelen zijn die u via de mond inneemt en/of insuline die per injectie wordt toegediend.

Het is belangrijk om u te blijven houden aan het advies over dieet en lichaamsbeweging dat u heeft gekregen van uw arts, apotheker of verpleegkundige.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als:

- u dialyseert, aangezien dit geneesmiddel dan niet wordt aanbevolen
- u diabetes type 1 heeft (het type waarbij uw lichaam geen insuline maakt) omdat dit geneesmiddel mogelijk niet goed voor u is.
- u diabetische ketoacidose heeft (een complicatie van diabetes die optreedt als het lichaam glucose niet kan afbreken omdat er onvoldoende insuline is). De verschijnselen zijn onder andere snel gewichtsverlies, misselijk zijn of overgeven, een zoete geur van de adem, een zoete of metaalachtige smaak in uw mond, of een andere geur van uw urine of transpiratie.
- u ernstige problemen met de vertering van voedsel heeft of voedsel langer dan normaal in uw maag blijft (inclusief gastroparese).
- u ooit pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier) heeft gehad met ernstige pijn in de buik en rug die niet weggaat.
- u een sulfonylureumderivaat of insuline tegen diabetes gebruikt, omdat u dan een lage bloedsuiker (hypoglykemie) kunt krijgen. Het kan zijn dat uw arts de dosis van deze andere geneesmiddelen moet veranderen om dit risico te verminderen.

Trulicity is geen insuline en mag derhalve niet als vervanger voor insuline worden gebruikt.

Bij het starten van de behandeling met Trulicity kunt u in sommige gevallen vochtverlies/uitdroging ervaren bijvoorbeeld in het geval van braken, misselijkheid en/of diarree hetgeen kan leiden tot een afname van de nierfunctie. Het is belangrijk om uitdroging te voorkomen door veel vocht te drinken. Neem contact op met uw arts als u vragen of zorgen heeft.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Trulicity wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat het bij deze patiënten niet is onderzocht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Trulicity kan de lediging van de maag vertragen wat andere geneesmiddelen kan beïnvloeden.

Gebruikt u naast Trulicity nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zwangerschap

Het is onbekend of dulaglutide schadelijk kan zijn voor uw ongeboren kind. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten tijdens behandeling met dulaglutide anticonceptie gebruiken. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts omdat Trulicity niet tijdens de zwangerschap mag worden gebruikt. Overleg met uw arts over de beste manier om uw bloedsuiker te reguleren als u zwanger bent.

Borstvoeding

Geeft u borstvoeding of wilt u borstvoeding gaan geven? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik Trulicity niet als u borstvoeding geeft. Het is onbekend of dulaglutide bij mensen in de moedermelk terechtkomt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Trulicity heeft weinig tot geen effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken. Echter, als u Trulicity in combinatie met een sulfonylureumderivaat of insuline gebruikt, kan uw bloedsuiker te laag worden (hypoglykemie), waardoor u zich mogelijk minder goed kunt concentreren. Vermijd het besturen van een voertuig of het gebruik van machines als u verschijnselen krijgt van een lage bloedsuiker. Zie rubriek 2, 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?' voor informatie over een toegenomen risico op een lage bloedsuiker. Zie ook rubriek 4 voor de waarschuwingssignalen van een lage bloedsuiker. Neem contact op met uw arts voor meer informatie.

Trulicity bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dit is in essentie "natriumvrij".

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts kan een dosis van 0,75 mg eenmaal per week aanbevelen voor de behandeling van uw diabetes. Dit is dan omdat u alléén Trulicity gebruikt, of omdat die dosis past bij uw eigen specifieke behoefte.

Als het met andere geneesmiddelen tegen diabetes wordt gebruikt, kan uw arts een dosering van 1,5 mg eenmaal per week aanbevelen.

Als uw bloedsuiker niet goed genoeg onder controle is, kan uw arts de dosis verhogen tot 3 mg eenmaal per week.

Als er nog meer controle van uw bloedsuiker nodig is, mag de dosis nog een keer worden verhoogd tot 4,5 mg eenmaal per week.

Elke pen bevat een wekelijkse dosis Trulicity (0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg of 4,5 mg). Elke pen levert slechts één dosis af.

U kunt uw pen op elk moment van de dag gebruiken, met of zonder voedsel. Zo mogelijk moet u het altijd op dezelfde dag van de week gebruiken. Als geheugensteun kunt u bij injecteren van uw eerste dosis de dag van de week aanvinken op de verpakking van uw pen of op een kalender.

Trulicity wordt onder de huid (subcutane injectie) van uw buik of bovenbeen (dij) ingespoten. Als de injectie door iemand anders wordt gegeven, mag dit ook in de bovenarm.

Als u wilt, kunt u elke week hetzelfde gebied op uw lichaam gebruiken. Zorg er wel voor dat u binnen dit gebied steeds een andere injectieplaats kiest.

Als u Trulicity met een sulfonylureumderivaat of insuline gebruikt, is het belangrijk dat u uw bloedsuiker regelmatig controleert, zoals u verteld is door uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Lees vóór u Trulicity gebruikt zorgvuldig de "Gebruikershandleiding" voor de pen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel van Trulicity heeft gebruikt, raadpleeg dan direct uw arts. Te veel van dit geneesmiddel kan uw bloedsuiker te laag maken (hypoglykemie) waardoor u misselijk kunt worden of overgeven.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeet een dosis te injecteren, en als het nog **minstens 3 dagen** duurt voor u de volgende dosis moet toedienen, injecteer dan uw dosis zo snel mogelijk. Injecteer uw volgende dosis op uw normale geplande dag.

Als het **minder dan 3 dagen** duurt voor u de volgende dosis moet toedienen, sla deze dosis dan over en injecteer de volgende dosis op uw volgende geplande dag.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Zo nodig kunt u ook de dag van de week waarop u Trulicity injecteert veranderen, zolang er maar minstens 3 dagen sinds uw vorige dosis Trulicity zijn verstreken.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop het gebruik van Trulicity niet zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt met het gebruik van Trulicity, kan uw bloedsuiker stijgen.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Zelden: kunnen optreden bij maximaal 1 op de 1.000 mensen

- Ernstige allergische reacties (anafylactische reacties, angio-oedeem).

U moet meteen naar uw arts gaan als u een van de volgende verschijnselen ervaart: huiduitslag, jeuk en snel opkomende zwellingen van de weefsels in de nek, gezicht, mond of keel, bultjes en moeilijkheden bij het ademen.

- Ontstoken alvleesklier (acute pancreatitis) die ernstige maag- en rugpijn kan veroorzaken en die niet over gaat.

U moet onmiddellijk naar uw arts gaan als u zulke verschijnselen ervaart.

Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

- Darmverstopping - een ernstige vorm van verstopping met bijkomende verschijnselen zoals maagpijn, een opgeblazen gevoel of braken.

U moet onmiddellijk naar uw arts gaan als u zulke verschijnselen ervaart

Andere bijwerkingen

Zeer vaak: kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 mensen

- Misselijkheid – dit verdwijnt gewoonlijk na verloop van tijd
- Braken – dit verdwijnt gewoonlijk na verloop van tijd
- Diarree – dit verdwijnt gewoonlijk na verloop van tijd
- Maagpijn (buikpijn).

Deze bijwerkingen zijn meestal niet ernstig. Ze komen het meeste voor als met dulaglutide wordt begonnen, maar nemen bij de meeste patiënten na verloop van tijd af.

- Lage bloedsuiker (hypoglykemie) komt zeer vaak voor als dulaglutide wordt gebruikt met geneesmiddelen die metformine, een sulfonylureumderivaat en/of insuline bevatten. Als u een sulfonylureumderivaat of insuline gebruikt, kan de dosis daarvan moeten worden verlaagd terwijl u dulaglutide gebruikt.
- Tekenen van een lage bloedsuiker kunnen zijn: hoofdpijn, slaperigheid, zwakte, duizeligheid, hongergevoel, verwardheid, prikkelbaarheid, snelle hartslag en transpireren. Uw arts dient u te vertellen hoe een lage bloedsuiker moet worden behandeld.

Vaak: kunnen optreden bij maximaal 1 op de 10 mensen

- Lage bloedsuiker (hypoglykemie) komt vaak voor als dulaglutide alleen wordt gebruikt of samen met metformine en pioglitazon, of met een natriumglucose-cotransporter 2-remmer (SGLT2-remmer) met of zonder metformine. Voor een lijst van de mogelijke tekenen, zie hierboven onder bijwerkingen die zeer vaak kunnen optreden.
- Minder honger (verminderde eetlust)
- Spijsverteringsstoornis
- Verstopping
- Winderigheid
- Opgeblazen maag
- Reflux of maagzuur dat omhoog komt (ook wel gastro-oesofageale refluxziekte genoemd) – een ziekte door maagzuur dat in uw slokdarm komt
- Boeren
- Zich moe voelen

- Verhoogde hartslag
- Vertraging van de elektrische stroompjes in het hart

Soms: kunnen optreden bij maximaal 1 op de 100 mensen

- Reacties op de injectieplaats (zoals uitslag of roodheid)
- Allergische reacties (overgevoeligheid) (bijv. zwelling, jeukende huiduitslag met bultjes (netelroos))
- Uitdroging, vaak gepaard gaande met misselijkheid, braken en/of diarree
- Galstenen
- Ontsteking van de galblaas

Zelden: kunnen optreden bij maximaal 1 op de 1.000 mensen

- Vertraagde lediging van de maag

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in Aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de pen en op de doos na EXP.

Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van de maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Trulicity kan uit de koelkast worden gehaald en tot 14 dagen worden bewaard bij een temperatuur van maximaal 30°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de pen beschadigd is, of het geneesmiddel troebel of verkleurd is of deeltjes bevat.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is dulaglutide.

- *Trulicity 0,75 mg*: Elke voorgevulde pen bevat 0,75 mg dulaglutide in 0,5 ml oplossing.
- *Trulicity 1,5 mg*: Elke voorgevulde pen bevat 1,5 mg dulaglutide in 0,5 ml oplossing.
- *Trulicity 3 mg*: Elke voorgevulde pen bevat 3 mg dulaglutide in 0,5 ml oplossing.
- *Trulicity 4,5 mg*: Elke voorgevulde pen bevat 4,5 mg dulaglutide in 0,5 ml oplossing.

De andere stoffen in dit middel zijn natriumcitraat (zie rubriek 2 onder “Trulicity bevat natrium” voor verdere informatie), Citroenzuur, mannitol, polysorbaat 80 en water voor injectie.

Hoe ziet Trulicity eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Trulicity is een heldere, kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevulde pen.

Elke voorgevulde pen bevat 0,5 ml oplossing.

De voorgevulde pen is alleen voor eenmalig gebruik.

Verpakkingsgroottes van 2, 4 of multiverpakkingen met 12 (3 verpakkingen van 4) voorgevulde pennen. Mogelijk zijn niet alle verpakkingsgrootten beschikbaar in uw land.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

Fabrikant

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Italië

Lilly France, 2, rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
тел. + 359 2 491 41 40

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S
Tlf: +45 45 26 60 00

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: +372 6 817 280

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 629 4600

España

Lilly S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

France

Lilly France
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

Lietuva

Eli Lilly Lietuva
Tel. +370 (5) 2649600

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Magyarország

Lilly Hungária Kft.
Tel: + 36 1 328 5100

Malta

Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Norge

Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel: +4822 440 33 00

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351-21-4126600

România

Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland

Icepharma hf.
Sími + 354 540 8000

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Κόπος

Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.APārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67364000

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0)1 580 00 10

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

United Kingdom (Northern Ireland)

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377


Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maand JJJJ

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (<http://www.ema.europa.eu>).

Gebruikershandleiding

Trulicity 0,75 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen dulaglutide



OVER TRULICITY VOORGEVULDE PEN

Lees deze instructies voor gebruik en de informatie voor de patiënt in de bijsluiter zorgvuldig en volledig voordat u de Trulicity voorgevulde pen gebruikt. Overleg met uw arts, apotheker of verpleegkundige over correcte injectie van Trulicity.

- De pen is een voorgevuld wegwerphulpmiddel voor toediening. Hij is klaar voor gebruik. Elke pen bevat een wekelijkse dosis Trulicity (0,75 mg). Elke pen levert slechts één dosis.
- **Trulicity wordt eenmaal per week toegediend.** Als geheugensteun kunt u op uw kalender aangeven wanneer u uw volgende dosis moet injecteren.
- Als u op de groene injectieknop drukt, zal de pen automatisch de naald **in uw huid** inbrengen, het geneesmiddel injecteren, en de naald **terugtrekken als de injectie klaar is.**

VOORDAT U BEGINT

Pak

het product uit de koelkast.

Laat de bodemdop erop zitten tot u klaar bent om te injecteren.

Controleer

het etiket om er zeker van te zijn dat u het juiste geneesmiddel heeft en de uiterste houdbaarheidsdatum niet is verstreken.

Inspecteer


de pen. Niet gebruiken als u ziet dat de pen beschadigd is, of het geneesmiddel troebel of verkleurd is of deeltjes bevat.

Maak u klaar


door uw handen te wassen.

KIES UW INJECTIEPLAATS

- Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u helpen om de injectieplaats te kiezen die voor u het beste is.
- U kunt het geneesmiddel in uw buik of bovenbeen injecteren.
- Iemand anders kan u de injectie in uw bovenarm geven.
- Verander (rouleer) uw injectieplaats elke week. U kunt hetzelfde gebied van uw lichaam gebruiken, maar zorg ervoor dat u elke keer een andere plaats in dat gebied kiest.



1. VERWIJDEREN VAN DE DOP
2. HET PLAATSEN EN HET ONTGRENDELEN
3. INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN




1 VERWIJDEREN VAN DE DOP

- Controleer of de pen **vergrendeld** is.
- Trek de grijze bodemdop eraf.

Plaats de bodemdop niet weer terug – daardoor kan de naald worden beschadigd. Raak de naald niet aan.

- Als de grijze bodemdop verwijderd is, ziet hij eruit zoals op de afbeelding hiernaast. U kunt de bodemdop weggooien.



Als de grijze bodemdop er niet hetzelfde uitziet als in de afbeelding hierboven, dan moet u:

- de pen **NIET** gebruiken.
- de pen en bodemdop op een veilige plaats bewaren en contact opnemen met Lilly.
- een nieuwe pen gebruiken.

2 HET PLAATSEN EN ONTGRENDELEN

- Plaats de doorzichtige onderkant plat en stevig tegen uw huid op de injectieplaats.


Ontgrendel door aan de blokkeering te draaien.



3 INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN

- Druk de groene injectieknop in en houd deze ingedrukt; u hoort een luide klik.

- !** Blijf de doorzichtige onderkant stevig tegen uw huid drukken, tot u een tweede klik hoort. Dit gebeurt na ongeveer 5-10 seconden, als de naald zich gaat terugtrekken.
- Haal de pen van uw huid af.



- U weet dat uw injectie klaar is als het grijze deel zichtbaar is.**

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bewaren en gebruiken
Pen weggooien
Veelgestelde vragen
Overige informatie
Hier vindt u meer informatie

BEWARING EN GEBRUIK

- De pen bevat glazen onderdelen. Ga er voorzichtig mee om. Als u hem op een hard oppervlak heeft laten vallen, gebruik de pen dan niet. Gebruik een nieuwe pen voor uw injectie.
- Bewaar uw pen in de koelkast.
- Als koeling niet mogelijk is, kunt u uw pen tot 14 dagen lang bij kamertemperatuur (onder 30°C) bewaren.
- Leg uw pen niet in de vriezer. Als uw pen bevroren is geweest, NIET GEBRUIKEN.
- Bewaar de pen in de oorspronkelijke verpakking om hem tegen licht te beschermen.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Zie de patiëntenbijsluiter voor volledige informatie over correcte bewaring.

PEN WEGGOOIEN

- Gooi de pen weg in een naaldencontainer of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige heeft gezegd.
- Gebruik de gevulde naaldencontainer niet opnieuw.
- Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u geneesmiddelen moet weggooien die u niet meer gebruikt.



VEELGESTELDE VRAGEN

Wat als ik een luchtbelletje in mijn pen zie?

Luchtbelletjes zijn normaal. Ze zijn niet schadelijk voor u en hebben geen invloed op uw dosis.

Wat als ik de pen ontgrendel en op de groene injectieknop druk, voordat ik de bodemdop eraf trek?

Verwijder de bodemdop niet en gebruik de pen niet. Gooi de pen weg zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige heeft gezegd. Injecteer uw dosis met een andere pen.

Wat als er aan de naaldpunt een druppel vloeistof zit als ik de bodemdop eraf trek?

Een druppel vloeistof op de naaldpunt is niet ongebruikelijk en heeft geen invloed op uw dosis.

Moet ik de injectieknop ingedrukt houden tot de injectie klaar is?

Dat hoeft niet, maar het kan helpen om de pen onbeweeglijk en stevig tegen uw huid te houden.

Ik heb meer dan twee klikken tijdens mijn injectie gehoord: twee luidere klikken en een zachte. Heb ik de hele injectie gekregen?

Sommige patiënten horen een zachte klik direct voor de tweede luide klik. Dat hoort bij de normale werking van de pen. Haal de pen niet van uw huid af tot u de tweede, luidere klik hoort.

Wat als er een druppel vloeistof of bloed op mijn huid zit na mijn injectie?

Dat is niet ongebruikelijk en heeft geen invloed op uw dosis.

Ik weet niet zeker of mijn pen goed heeft gewerkt.


Kijk of u uw dosis heeft ontvangen. Uw dosis is goed afgegeven als het grijze deel zichtbaar is (zie stap 3). Neem ook contact op met het lokale filiaal van Lilly, genoemd in de bijsluiter, voor verdere instructies. Tot dan bergt u de pen veilig op om te voorkomen dat u zich per ongeluk aan de naald prikt.

OVERIGE INFORMATIE

- Als u slechtziend bent, gebruik uw pen dan NIET zonder hulp van iemand die getraind is in het gebruik van de Trulicity-pen.

HIER VINDT U MEER INFORMATIE

- Als u vragen of problemen heeft met uw Trulicity-pen, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.



**SCAN DEZE CODE OM NAAR
www.trulicity.eu TE GAAN**

Voor het laatst goedgekeurd in maand JJJJ

Gebruikershandleiding

Trulicity 1,5 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen dulaglutide



← Uitvouwen en plat leggen →



Lees beide zijden voor volledige instructies

OVER TRULICITY VOORGEVULDE PEN

Lees deze instructies voor gebruik en de informatie voor de patiënt in de bijsluiter zorgvuldig en volledig voordat u de Trulicity voorgevulde pen gebruikt. Overleg met uw arts, apotheker of verpleegkundige over correcte injectie van Trulicity.

- De pen is een voorgevuld wegwerphulpmiddel voor toediening. Hij is klaar voor gebruik. Elke pen bevat een wekelijkse dosis Trulicity (1,5 mg). Elke pen levert slechts één dosis.
- **Trulicity wordt eenmaal per week toegediend.** Als geheugensteun kunt u op uw kalender aangeven wanneer u uw volgende dosis moet injecteren.
- Als u op de groene injectieknop drukt, zal de pen automatisch de naald **in uw huid** inbrengen, het geneesmiddel injecteren, en de naald **terugtrekken als de injectie klaar is.**

VOORDAT U BEGINT

Pak

het product uit de koelkast.

Laat de bodemdop erop zitten tot u klaar bent om te injecteren.

Controleer

het etiket om er zeker van te zijn dat u het juiste geneesmiddel heeft en de uiterste houdbaarheidsdatum niet is verstreken.

Inspecteer


de pen. Niet gebruiken als u ziet dat de pen beschadigd is, of het geneesmiddel troebel of verkleurd is of deeltjes bevat.

Maak u klaar


door uw handen te wassen.

KIES UW INJECTIEPLAATS

- Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u helpen om de injectieplaats te kiezen die voor u het beste is.
- U kunt het geneesmiddel in uw buik of bovenbeen injecteren.
- Iemand anders kan u de injectie in uw bovenarm geven.
- Verander (rouleer) uw injectieplaats elke week. U kunt hetzelfde gebied van uw lichaam gebruiken, maar zorg ervoor dat u elke keer een andere plaats in dat gebied kiest.



1. VERWIJDEREN VAN DE DOP
2. HET PLAATSEN EN HET ONTGRENDELEN
3. INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN




1. VERWIJDEREN VAN DE DOP

- Controleer of de pen **vergrendeld** is.
- Trek de grijze bodemdop eraf.

Plaats de bodemdop niet weer terug – daardoor kan de naald worden beschadigd. Raak de naald niet aan.

- Als de grijze bodemdop verwijderd is, ziet hij eruit zoals op de afbeelding hiernaast. U kunt de bodemdop weggooien.




Als de grijze bodemknop er niet hetzelfde uitziet als in de afbeelding hierboven, dan moet u:

- de pen **NIET** gebruiken.
- de pen en bodemdop op een veilige plaats bewaren en contact opnemen met Lilly.
- een nieuwe pen gebruiken.

2. HET PLAATSEN EN ONTGRENDELEN

- Plaats de doorzichtige onderkant plat en stevig tegen uw huid op de injectieplaats.


Ontgrendel door aan de blokkeerring te draaien.



3. INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN

- Druk de groene injectieknop in en houd deze ingedrukt; u hoort een luide klik.

- !** Blijf de doorzichtige onderkant stevig tegen uw huid drukken, tot u een tweede klik hoort. Dit gebeurt na ongeveer 5-10 seconden, als de naald zich gaat terugtrekken.
- Haal de pen van uw huid af.



- U weet dat uw injectie klaar is als het grijze deel zichtbaar is.**

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bewaren en gebruiken
Pen weggooien
Veelgestelde vragen
Overige informatie
Hier vindt u meer informatie

BEWARING EN GEBRUIK

- De pen bevat glazen onderdelen. Ga er voorzichtig mee om. Als u hem op een hard oppervlak heeft laten vallen, gebruik de pen dan niet. Gebruik een nieuwe pen voor uw injectie.
- Bewaar uw pen in de koelkast.
- Als koeling niet mogelijk is, kunt u uw pen tot 14 dagen lang bij kamertemperatuur (onder 30°C) bewaren.
- Leg uw pen niet in de vriezer. Als uw pen bevroren is geweest, NIET GEBRUIKEN.
- Bewaar de pen in de oorspronkelijke verpakking om hem tegen licht te beschermen.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Zie de patiëntenbijsluiters voor volledige informatie over correcte bewaring.

PEN WEGGOOIEN

- Gooi de pen weg in een naalden-container of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige heeft gezegd.
- Gebruik de gevulde naalden-container niet opnieuw.
- Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u geneesmiddelen moet weggooien die u niet meer gebruikt.



VEELGESTELDE VRAGEN

Wat als ik een luchtbelletje in mijn pen zie?

Luchtbelletjes zijn normaal. Ze zijn niet schadelijk voor u en hebben geen invloed op uw dosis.

Wat als ik de pen ontgrendel en op de groene injectieknop druk, voordat ik de bodemdop eraf trek?

Verwijder de bodemdop niet en gebruik de pen niet. Gooi de pen weg zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige heeft gezegd. Injecteer uw dosis met een andere pen.

Wat als er aan de naaldpunt een druppel vloeistof zit als ik de bodemdop eraf trek?

Een druppel vloeistof op de naaldpunt is niet ongebruikelijk en heeft geen invloed op uw dosis.

Moet ik de injectieknop ingedrukt houden tot de injectie klaar is?

Dat hoeft niet, maar het kan helpen om de pen onbeweeglijk en stevig tegen uw huid te houden.

Ik heb meer dan twee klikken tijdens mijn injectie gehoord: twee luidere klikken en een zachte. Heb ik de hele injectie gekregen?

Sommige patiënten horen een zachte klik direct voor de tweede luide klik. Dat hoort bij de normale werking van de pen. Haal de pen niet van uw huid af tot u de tweede luidere, klik hoort.

Wat als er een druppel vloeistof of bloed op mijn huid zit na mijn injectie?

Dat is niet ongebruikelijk en heeft geen invloed op uw dosis.

Ik weet niet zeker of mijn pen goed heeft gewerkt.


Kijk of u uw dosis heeft ontvangen. Uw dosis is goed afgegeven als het grijze deel zichtbaar is (zie stap 3). Neem ook contact op met het lokale filiaal van Lilly, genoemd in de bijsluiter, voor verdere instructies. Tot dan bergt u de pen veilig op om te voorkomen dat u zich per ongeluk aan de naald prikt.

OVERIGE INFORMATIE

- Als u slechtziend bent, gebruik uw pen dan NIET zonder hulp van iemand die getraind is in het gebruik van de Trulicity-pen.

HIER VINDT U MEER INFORMATIE

- Als u vragen of problemen heeft met uw Trulicity-pen, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.




SCAN DEZE CODE OM NAAR
www.trulicity.eu TE GAAN

Voor het laatst goedgekeurd in maand JJJJ

Gebruikershandleiding

Trulicity 3 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen dulaglutide



← Uitvouwen en plat leggen →



Lees beide zijden voor volledige instructies

OVER TRULICITY VOORGEVULDE PEN

Lees deze instructies voor gebruik en de informatie voor de patiënt in de bijsluiter zorgvuldig en volledig voordat u de Trulicity voorgevulde pen gebruikt. Overleg met uw arts, apotheker of verpleegkundige over correcte injectie van Trulicity.

- De pen is een voorgevuld wegwerphulpmiddel voor toediening. Hij is klaar voor gebruik. Elke pen bevat een wekelijkse dosis Trulicity (3 mg). Elke pen levert slechts één dosis.
- **Trulicity wordt eenmaal per week toegediend.** Als geheugensteun kunt u op uw kalender aangeven wanneer u uw volgende dosis moet injecteren.
- Als u op de groene injectieknop drukt, zal de pen automatisch de naald **in uw huid** inbrengen, het geneesmiddel injecteren, en de naald **terugtrekken als de injectie klaar is.**

VOORDAT U BEGINT

Pak

het product uit de koelkast.

Laat de bodemdop erop zitten tot u klaar bent om te injecteren.

Controleer

het etiket om er zeker van te zijn dat u het juiste geneesmiddel heeft en de uiterste houdbaarheidsdatum niet is verstreken.

Inspecteer


de pen. Niet gebruiken als u ziet dat de pen beschadigd is, of het geneesmiddel troebel of verkleurd is of deeltjes bevat.

Maak u klaar

door uw handen te wassen.

KIES UW INJECTIEPLAATS


- Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u helpen om de injectieplaats te kiezen die voor u het beste is.
- U kunt het geneesmiddel in uw buik of bovenbeen injecteren.
- Iemand anders kan u de injectie in uw bovenarm geven.
- Verander (rouleer) uw injectieplaats elke week. U kunt hetzelfde gebied van uw lichaam gebruiken, maar zorg ervoor dat u elke keer een andere plaats in dat gebied kiest.




VOOR

ACHTER

1. VERWIJDEREN VAN DE DOP
2. HET PLAATSEN EN HET ONTGRENDELEN
3. INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN



1 VERWIJDEREN VAN DE DOP

-  Controleer of de pen **vergrendeld** is.
- Trek de grijze bodemdop eraf.

Plaats de bodemdop niet weer terug – daardoor kan de naald worden beschadigd. Raak de naald niet aan.

- Als de grijze bodemdop verwijderd is, ziet hij eruit zoals op de afbeelding hiernaast. U kunt de bodemdop weggooien.



Als de grijze bodemknop er niet hetzelfde uitziet als in de afbeelding hierboven, dan moet u:

- de pen **NIET** gebruiken.
- de pen en bodemdop op een veilige plaats bewaren en contact opnemen met Lilly.
- een nieuwe pen gebruiken.

2 HET PLAATSEN EN ONTGRENDELEN


- Plaats de doorzichtige onderkant plat en stevig tegen uw huid op de injectieplaats.

-  **Ontgrendel** door aan de blokkeering te draaien.




3 INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN

- Druk de groene injectieknop in en houd deze ingedrukt; u hoort een luide klik.

-  Blijf de doorzichtige onderkant stevig tegen uw huid drukken, tot u een tweede klik hoort. Dit gebeurt na ongeveer 5-10 seconden, als de naald zich gaat terugtrekken.

- Haal de pen van uw huid af.



- **U weet dat uw injectie klaar is als het grijze deel zichtbaar is.**

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bewaren en gebruiken

Pen weggooien

Veelgestelde vragen

Overige informatie

Hier vindt u meer informatie

BEWARING EN GEBRUIK

- De pen bevat glazen onderdelen. Ga er voorzichtig mee om. Als u hem op een hard oppervlak heeft laten vallen, gebruik de pen dan niet. Gebruik een nieuwe pen voor uw injectie.
- Bewaar uw pen in de koelkast.
- Als koeling niet mogelijk is, kunt u uw pen tot 14 dagen lang bij kamertemperatuur (onder 30°C) bewaren.
- Leg uw pen niet in de vriezer. Als uw pen bevroren is geweest, NIET GEBRUIKEN.
- Bewaar de pen in de oorspronkelijke verpakking om hem tegen licht te beschermen.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Zie de patiëntenbijsluiter voor volledige informatie over correcte bewaring.

PEN WEGGOOIEN

- Gooi de pen weg in een naaldencontainer of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige heeft gezegd.
- Gebruik de gevulde naaldencontainer niet opnieuw.
- Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u geneesmiddelen moet weggooien die u niet meer gebruikt.



VEELGESTELDE VRAGEN

Wat als ik een luchtbelletje in mijn pen zie?

Luchtbelletjes zijn normaal. Ze zijn niet schadelijk voor u en hebben geen invloed op uw dosis.

Wat als ik de pen ontgrendel en op de groene injectieknop druk, voordat ik de bodemdop eraf trek?

Verwijder de bodemdop niet en gebruik de pen niet. Gooi de pen weg zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige heeft gezegd. Injecteer uw dosis met een andere pen.

Wat als er aan de naaldpunt een druppel vloeistof zit als ik de bodemdop eraf trek?

Een druppel vloeistof op de naaldpunt is niet ongebruikelijk en heeft geen invloed op uw dosis.

Moet ik de injectieknop ingedrukt houden tot de injectie klaar is?

Dat hoeft niet, maar het kan helpen om de pen onbeweeglijk en stevig tegen uw huid te houden.

Ik heb meer dan twee klikken tijdens mijn injectie gehoord: twee luidere klikken en een zachte. Heb ik de hele injectie gekregen?

Sommige patiënten horen een zachte klik direct voor de tweede luide klik. Dat hoort bij de normale werking van de pen. Haal de pen niet van uw huid af tot u de tweede, luidere klik hoort.

Wat als er een druppel vloeistof of bloed op mijn huid zit na mijn injectie?

Dat is niet ongebruikelijk en heeft geen invloed op uw dosis.

Ik weet niet zeker of mijn pen goed heeft gewerkt.


Kijk of u uw dosis heeft ontvangen. Uw dosis is goed afgegeven als het grijze deel zichtbaar is (zie stap 3). Neem ook contact op met het lokale filiaal van Lilly, genoemd in de bijsluiter, voor verdere instructies. Tot dan bergt u de pen veilig op om te voorkomen dat u zich per ongeluk aan de naald prikt.

OVERIGE INFORMATIE

- Als u slechtziend bent, gebruik uw pen dan NIET zonder hulp van iemand die getraind is in het gebruik van de Trulicity-pen.

HIER VINDT U MEER INFORMATIE

- Als u vragen of problemen heeft met uw Trulicity-pen, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.




SCAN DEZE CODE OM NAAR
www.trulicity.eu TE GAAN

Voor het laatst goedgekeurd in maand JJJJ

Gebruikershandleiding

Trulicity 4,5 mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen dulaglutide

VERBREEK
ZEGEL



VERBREEK
ZEGEL

← Uitvouwen en plat leggen →



Lees beide zijden voor volledige instructies

OVER TRULICITY VOORGEVULDE PEN

Lees deze instructies voor gebruik en de informatie voor de patiënt in de bijsluiter zorgvuldig en volledig voordat u de Trulicity voorgevulde pen gebruikt. Overleg met uw arts, apotheker of verpleegkundige over correcte injectie van Trulicity.

- De pen is een voorgevuld wegwerphulpmiddel voor toediening. Hij is klaar voor gebruik. Elke pen bevat een wekelijkse dosis Trulicity (3 mg). Elke pen levert slechts één dosis.
- **Trulicity wordt eenmaal per week toegediend.** Als geheugensteun kunt u op uw kalender aangeven wanneer u uw volgende dosis moet injecteren.
- Als u op de groene injectieknop drukt, zal de pen automatisch de naald **in uw huid** inbrengen, het geneesmiddel injecteren, en de naald **terugtrekken als de injectie klaar is.**

VOORDAT U BEGINT

Pak

het product uit de koelkast.

Laat de bodemdop erop zitten tot u klaar bent om te injecteren.

Controleer

het etiket om er zeker van te zijn dat u het juiste geneesmiddel heeft en de uiterste houdbaarheidsdatum niet is verstreken.

Inspecteer


de pen. Niet gebruiken als u ziet dat de pen beschadigd is, of het geneesmiddel troebel of verkleurd is of deeltjes bevat.

Maak u klaar

door uw handen te wassen.

KIES UW INJECTIEPLAATS


- Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u helpen om de injectieplaats te kiezen die voor u het beste is.
- U kunt het geneesmiddel in uw buik of bovenbeen injecteren.
- Iemand anders kan u de injectie in uw bovenarm geven.
- Verander (rouleer) uw injectieplaats elke week. U kunt hetzelfde gebied van uw lichaam gebruiken, maar zorg ervoor dat u elke keer een andere plaats in dat gebied kiest.




VOOR

ACHTER

1. VERWIJDEREN VAN DE DOP
2. HET PLAATSEN EN HET ONTGRENDELEN
3. INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN




1. VERWIJDEREN VAN DE DOP

 Controleer of de pen **vergrendeld** is.

- Trek de grijze bodemdop eraf.

Plaats de bodemdop niet weer terug – daardoor kan de naald worden beschadigd. Raak de naald niet aan.

- Als de grijze bodemdop verwijderd is, ziet hij eruit zoals op de afbeelding hiernaast. U kunt de bodemdop weggooien.





Als de grijze bodemknop er niet hetzelfde uitziet als in de afbeelding hierboven, dan moet u:

- de pen **NIET** gebruiken.
- de pen en bodemdop op een veilige plaats bewaren en contact opnemen met Lilly.
- een nieuwe pen gebruiken.

2. HET PLAATSEN EN ONTGRENDELEN


- Plaats de doorzichtige onderkant plat en stevig tegen uw huid op de injectieplaats.

 **Ontgrendel** door aan de blokkeerring te draaien.




3. INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN

- Druk de groene injectieknop in en houd deze ingedrukt; u hoort een luide klik.

 Blijf de doorzichtige onderkant stevig tegen uw huid drukken, tot u een tweede klik hoort. Dit gebeurt na ongeveer 5-10 seconden, als de naald zich gaat terugtrekken.

- Haal de pen van uw huid af.



- U weet dat uw injectie klaar is als het grijze deel zichtbaar is.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bewaren en gebruiken

Pen weggooien

Veelgestelde vragen

Overige informatie

Hier vindt u meer informatie

BEWARING EN GEBRUIK

- De pen bevat glazen onderdelen. Ga er voorzichtig mee om. Als u hem op een hard oppervlak heeft laten vallen, gebruik de pen dan niet. Gebruik een nieuwe pen voor uw injectie.
- Bewaar uw pen in de koelkast.
- Als koeling niet mogelijk is, kunt u uw pen tot 14 dagen lang bij kamertemperatuur (onder 30°C) bewaren.
- Leg uw pen niet in de vriezer. Als uw pen bevroren is geweest, NIET GEBRUIKEN.
- Bewaar de pen in de oorspronkelijke verpakking om hem tegen licht te beschermen.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Zie de patiëntenbijsluiter voor volledige informatie over correcte bewaring.

PEN WEGGOOIEN

- Gooi de pen weg in een naaldencontainer of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige heeft gezegd.
- Gebruik de gevulde naaldencontainer niet opnieuw.
- Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige hoe u geneesmiddelen moet weggooien die u niet meer gebruikt.



VEELGESTELDE VRAGEN

Wat als ik een luchtbelletje in mijn pen zie?

Luchtbelletjes zijn normaal. Ze zijn niet schadelijk voor u en hebben geen invloed op uw dosis.

Wat als ik de pen ontgrendel en op de groene injectieknop druk, voordat ik de bodemdop eraf trek?

Verwijder de bodemdop niet en gebruik de pen niet. Gooi de pen weg zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige heeft gezegd. Injecteer uw dosis met een andere pen.

Wat als er aan de naaldpunt een druppel vloeistof zit als ik de bodemdop eraf trek?

Een druppel vloeistof op de naaldpunt is niet ongebruikelijk en heeft geen invloed op uw dosis.

Moet ik de injectieknop ingedrukt houden tot de injectie klaar is?

Dat hoeft niet, maar het kan helpen om de pen onbeweeglijk en stevig tegen uw huid te houden.

Ik heb meer dan twee klikken tijdens mijn injectie gehoord: twee luidere klikken en een zachte. Heb ik de hele injectie gekregen?

Sommige patiënten horen een zachte klik direct voor de tweede luide klik. Dat hoort bij de normale werking van de pen. Haal de pen niet van uw huid af tot u de tweede, luidere klik hoort.

Wat als er een druppel vloeistof of bloed op mijn huid zit na mijn injectie?

Dat is niet ongebruikelijk en heeft geen invloed op uw dosis.

Ik weet niet zeker of mijn pen goed heeft gewerkt.


Kijk of u uw dosis heeft ontvangen. Uw dosis is goed afgegeven als het grijze deel zichtbaar is (zie stap 3). Neem ook contact op met het lokale filiaal van Lilly, genoemd in de bijsluiter, voor verdere instructies. Tot dan bergt u de pen veilig op om te voorkomen dat u zich per ongeluk aan de naald prikt.

OVERIGE INFORMATIE

- Als u slechtziend bent, gebruik uw pen dan NIET zonder hulp van iemand die getraind is in het gebruik van de Trulicity-pen.

HIER VINDT U MEER INFORMATIE

- Als u vragen of problemen heeft met uw Trulicity-pen, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.



SCAN DEZE CODE OM NAAR
www.trulicity.eu TE GAAN

Voor het laatst goedgekeurd in maand JJJJ